

an Ort und Stelle ausgestorben, während die Kreuzung sich erhalten konnte): *Carex flava* — Oederi (überall im Riede), *Salix repens* × *cinerea* (Schaanwald—Mauren, Nofels—Ruggell), *Arabis ciliata* × *hirsuta* (Triefen, Ruggell), *Hypericum perforatum* — *maculatum* (in den Mooren verbreitet), *Viola Riviniana* × *canina* (überall auf Moorniesen, meist ohne *V. canina*), *V. Riviniana* × *rupestris* (Schaanwald, Schaan), *Circaea lutetiana* — *alpina* (Daduz, Roter Boden, Lamena, in Planken schon von Häusle gefunden), *Taraxacum levigatum* — *officinale* (Daduz, Schaanwald), *Hieracium florentinum* — *pratense* (Nofels), *Hieracium florentinum* — *cymosum* (Ruggell), *H. aurantiacum* — *furcatum* (Tuffhütten).

Don eigenartigen, für das Gebiet bezeichnenden Formen seien erwähnt: *Briza media* var. *pallescens* J. Murr (Bangs, Tisis, Gafadura, Gaflei usw.), *Phragmites communis* var. *striatipicta* (Schaanwald), *Agropyrum caninum* var. *pauciflorum* (Daduz usw.), *Carex stellulata* var. *hylogiton* (unter Mauren), *C. panicea* var. *subgranulata* J. Murr (Nofels), *C. ferruginea* var. *capillarioides* J. Murr (Rojaberg, Dalüna-Oberjäß usw.), *C. hirta* var. *hirtiformis* (Ruggell, Feldkircher Aelple), *Populus tremula* var. *orbicans* J. Murr (Triefenberg—Sücca), *Anemone hepatica* var. *rhaetica* (Schaan, Daduz, Klein-Mels), *Ranunculus flammula* var. *maior* und var. *serratus* (Nofels—Ruggell, Hub), *Aquilegia atrovioacea* var. *cyanescens* (Schellenberg, Ruggell), *Reseda lutea* var. *scabriuscula* (beim Schloß Daduz), *Viola collina* var. *Pfaffiana* J. Murr (Schaan, Daduz, Klein-Mels), *Euphorbia helioscopia* var. *perramosa* (Daduz, Weinland), *Hypericum hirsutum* var. *pseudomontanum* J. Murr (verbreitet), *Geranium sanguineum* var. *villosum* J. Murr (Ellmulde), *Trifolium pseudoprocumbens* var. *erectum* J. Murr (Tisis, Schaan), *T. pratense* var. *parviflorum* Borb. (Nofels—Bangs), *Lathyrus pratensis* var. *villosus* (Tisis, Ruggell, Planken—Gafadura), *Chaerophyllum aureum* var. *glabrum* (Tisis-Schaanwald), *Heracleum sphondylium* var. *longifolium* (Sträsch, Aelple, Triefenberg), var. *elegans* (Dalüna-Oberjäß), *Gentiana ciliata* nov. var. *Kelleri* J. Murr<sup>1)</sup>, *Scabiosa columbaria* var. *banatica* (Schloß Daduz), *Achillea millefolium* var. *scabra* (auf Moorniesen verbreitet)

1) forma subalpina, differt a typo lobis corollae multo brevioribus obtusis vel rotundatis, foliis latioribus, crassioribus, approximatis, colore