




Sk. 21. Nichtblühender, gescheckter  
Trieb



Sk. 22. Blüte der  
*Goodyera repens*

### Das Grosse Zweiblatt (*Listera ovata*)

Sehr häufig in den Auwäldern, an feuchten Wiesenstellen, an Waldrändern, an den Abzugsgräben im Ried, aufsteigend bis ins Lawena und in den Steg, Malbun-Sa-eis (Murr vermerkt: Garsella 1890 m) findet sich diese wenig auffallende, schattenliebende Orchidee, die übrigens recht stattlich werden kann. Am Waldrand im Schwefel (Vaduz) mass ich z. B. an einem Exemplar 75 cm Höhe (Normalmass: 30 — 60 cm) und zählte über 80 Einzelblüten. Die 2 eiförmigen Blätter können recht gross werden. Die Blüten sind gelbgrün, die Lippe ist lang und mehr oder weniger tief geteilt. (Sk. 23a)

An Variationen dieser Art unterscheidet man eine besonders breitblättrige var. *platyglossa*, die Murr in Nendeln-Schaan feststellte, ebenso eine Zwergform var. *coeloglossoides* ob Schaan.

### Das Kleine Zweiblatt (*Listera cordata*)

In den dunklen Fichtenwäldern vom Steg, etwas hinter dem neuen Stauweiher bis hinauf gegen Sücca-Aelple findet sich in kleinen Trüppchen zusammenstehend nicht selten dieses ganz zart gebaute Pflänzchen, das mit seinen beiden etwa in der Mitte des Stengels stehenden herz-deltaförmigen Blättern etwa einem Buchenkeimling ähnlich ist. Die netzadrigen Blätter glänzen ähnlich dem