

| | Seite |
|--|-------|
| Fossilführung und Alter | 178 |
| Unterscheidung von ähnlichen Serien | 178 |
| Mächtigkeit | 178 |
| Beste Aufschlüsse | 179 |
| <i>Die Tristelschichten</i> («Urgo-Aptien», ? Ob. Barrémien-? Bedoulien) | 179 |
| Bezeichnung | 179 |
| Kurze Charakterisierung der Serie | 179 |
| Lithologische Einzelheiten | 181 |
| Die kleinzyklische Gliederung | 182 |
| Fossilführung und Alter | 182 |
| Mächtigkeit | 184 |
| Beste Aufschlüsse | 184 |
| Zur Bezeichnung Tristelschichten | 184 |
| <i>Der Gault</i> (? Gargasien-Cénomaniën) | 186 |
| Bezeichnung und Abgrenzung | 186 |
| Kurze Charakterisierung der Serie | 186 |
| Fossilführung und Alter | 192 |
| Mächtigkeit | 192 |
| Beste Aufschlüsse | 193 |
| <i>Die Couches rouges</i> (Turonien-Maestrichtien) | 194 |
| Kurze Beschreibung der Serie | 194 |
| Fossilführung und Alter | 195 |
| Die lokale Couches rouges-Transgression in der basalen Schuppenzone der Falknis-Decke | 199 |
| Mächtigkeit | 200 |
| Beste Aufschlüsse | 200 |
| <i>Die Globorotalienschichten</i> (? Daniën-Paleocaen) | 201 |
| Bezeichnung der Serie | 201 |
| Kurze Charakterisierung der Serie | 201 |
| Alter und Fossilführung | 201 |
| Mächtigkeit | 202 |
| Beste Aufschlüsse | 202 |
| <i>Der Flysch der Falknis-Decke</i> «Falknisflysch» (Ob. Paleocaen-Unt. Eocaen) | 202 |
| Kurze Charakterisierung der Serie | 202 |
| Die Transgressionen des Falknis-Flysches | 202 |