

Tabelle 27

*Sus scrofa* L. (W = Wildschwein)

Scapula (S. 85)

Schussenriederschicht

1. Hals, kl. $\phi$	20,5	20,5	22	22	22,5	23	23,5	24,5	24,5
2. Pars artic., $\phi$	—	32,5	—	35,5	(36)	—	—	—	—
3. Gelenkfl., $\phi$	—	24	—	27	(26)	—	—	—	—
4. Gelenkfl. Breite	—	22,5	—	25,5	—	—	—	24	—

Schussenried

Michelsbergerschicht

			Mw.									
1.	25	25	23	20,5	21,5	21,5	22,5	23	23,5	23,5	24	24
2.	—	—	—	33	—	—	33	—	—	—	35	—
3.	—	—	—	27	—	—	25,5	—	—	—	29	—
4.	—	24	—	(23)	—	—	23	—	—	—	25,5	(25)

Michelsberg

Horgenerschicht

			Mw.					Mw.	W	W	Neol.
1.	24,5	25	23	22	24	24,5	25,5	24	28,5	36	Mw., 23,2
2.	—	38	—	—	—	—	—	—	—	50,5	—
3.	—	27	—	—	—	—	—	—	37	38	—
4.	—	25	—	—	(23,5)	—	—	—	28,5	32	—

Bronzezeit

							Mw.
1.	21	23	23,5	24	24	24,5	23,3
2.	30	—	35	(34)	36,5	—	—
3.	24,5	—	28	(28,5)	27,5	—	—
4.	—	—	—	(24,5)	—	—	—

Eisenzeit

								Mw.	W
1.	22,5	22,5	23,5	25	25	25	25	24	28
2.	35	—	—	(34)	—	—	—	—	—
3.	(30)	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	(25)	—	—	(25)	—	—	—	—	—

Humerus (S. 85 f.) Breite distal

Schussenried	37	37,5	37,5	39,5	42				W?	W
Michelsberg	37,5	38	38	38	39	39,5	(40)	40,5	44	54,5
Horgen	(39)				W?	W?				
Bronzezeit	(36,5)	37	40,5	42	45	(46)			W	
Eisenzeit	36	37	37,5	39	40	41	43	43,5	58	