

Ordnung *Stemonitales*

***Stemonitis axifera* (BULL.) MACBR.**

Fundorte: Malbun, Kalberbüchel, 1600 m (K 18): liegd. *Picea abies*-Stamm, MFB 1980-08-06, Li 350. — Lattenhöhe oberhalb Bargella, 1810 m (G 15): liegd. *Picea abies*-Stamm, JPP + SP + RW + WZ 1980-09-27.

Ordnung *Physarales*

***Fuligo septica* (L.) WIGGERS — Lohblüte**

Fundort: Bargella, 1500 m (G 15): liegd. *Abies alba*-Stamm, JPP + SP + RW + WZ 1980-09-27.

Abteilung **EUMYCOTA** (Echte Pilze)

Klasse **ASCOMYCETES** (Schlauchpilze)

Unterklasse **EUASCOMYCETIDAE**

Ordnung *Pezizales*

Familie **Helvellaceae**

***Discina perlata* (FR.) FR.**

Fundorte: Von R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) im Ruggeller Täle und am Eschnerberg an morschen Nadelholzstrünken gefunden (1978-04-15; 1979-04-07 und 1980-04-/-).

Ein typischer Frühjahrspilz an Nadelholzresten. Wirtschaftlich nicht bedeutsam.

Familie **Humariaceae**

***Geopyxis carbonaria* (ALB. & SCHWEIN. ex FR.) SACC.**

Fundort: Von RICK (1898 a) im «Malbunthal. Auf einer Brandstelle» gefunden.

Eine nicht häufige, an Brandstellen und verkohltes Holz gebundene Art.

***Scutellinia scutellata* (L. ex ST. AMANS) LAMB. — Schildförmiger Borstling**

Fundort: Guschg, Stachler, 1630 m (L 18): schwimmendes Holz in einem Tümpel, MFB 1980-08-06, Li 358.

Eine häufige Art an feuchtem Totholz. Wirtschaftlich unbedeutend.