

Hypoxylon multiforme (FR.) FR.

F u n d o r t : Balzers, Ellhorn-Grat, 710 m (B 25): liegd. *Betula pendula*-Stamm, MFB + SP + WZ 1980-03-01, Li 234.

Substratspezifischer Saprophyt an abgestorbenen Birkenästen und -stämmen.

Hypoxylon nummularium BUILL. ex FR.

F u n d o r t : Mauren, 600 m (cf. F 6): *Fagus sylvatica*-Ast, JPP 1980-12-/, Li 484.

Saprophyt an abgestorbenen Buchenästen.

Hypoxylon rubiginosum (PERS. ex FR.) FR.

F u n d o r t : Von RICK (1903) auf dem Schellenberg an *Fraxinus* gefunden.

Hypoxylon rutilum TUL.

F u n d o r t : Von RICK (1898 a) im «Saminathal. An Buche» angegeben.

Morphologisch *H. fragiforme* ähnlich, doch durch kleinere Ascosporen gekennzeichnet (vgl. DENNIS 1978: 315).

Nummularia bulliardii TUL.

F u n d o r t : Balzers, Ellhorn-Grat, 710 m (B 25): abgestorb. *Fagus sylvatica*-Stamm, MFB + SP + WZ 1980-03-01, Li 233.

Ustulina deusta (FR.) PETRAK — Brandkrustenpilz

F u n d o r t e : Triesen, Unter dem Magruelstein, 500 m (E 22): lebd. *Fagus sylvatica*-Stamm, MFB + SP 1979-11-17, Li 74. — Triesen, Beim Forsthaus, 620 m (F 20): *Fagus sylvatica*, MFB + SP 1980-03-01. — Schellenberg, Haldenmäder, 435 m (F 5): liegd. *Fraxinus excelsior*-Stamm, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Eschner Berg, Lutzengütle, 580 m (E 6): morsch Laubholz, RW 1980-04-19, Li 327. — Balzers, 500 m (D 23): agestorb. *Fagus sylvatica*-Stamm, JPP 1980-10-/, Li 465.

Saprophyt, gelegentlich auch Wundparasit an Laubholz, gerne an alten Rotbuchenstämmen. Häufig und weit verbreitet.

Xylaria hypoxylon (L. ex HOOK.) GREV. — Geweihförmige Holzkeule

F u n d o r t e : Vaduz, Fichtenwald hinter dem Pfadfinderheim, 570 m (E 14): Laubholz, WZ 1979-09-30, Li 46. — Gamprin, Saluns (E 6): *Fagus sylvatica*-Strunk, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Balzers, Ellhorn, 500 m (A 25): *Fagus sylvatica*-Strunk, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Gamprin-Bendern, Auenwald, 440 m (C 7): liegd. Dürrholtz, EW 1980-02-/. — Schaanwald, Rüttiwald, 540 m