

(G 8): *Fraxinus excelsior*-Strunk, MFB + SP + RW 1980-09-28. — Schaan, Lange Teile, 450 m (D 10): Baumstrunk, EW 1980-11-/, det. WZ (schriftl. Mitt.).

Häufiger und weit verbreiteter Saprophyt an Laubholz-Strünken, gelegentlich auch an Lagerholz. Seltener an Koniferen. Am Verstokungsprozess frisch gefällten Holzes beteiligt (nach BUTIN & ZYCHA 1973: 149).

Xylaria longipes NITSCHKE — Langstielige Holzkeule

Fundort: Schaanwald, Rüttiwald, 540 m (G 8): abgestorbener *Fraxinus excelsior*-Stamm(fuss), MFB + SP + RW 1980-09-28, Li 411.

Xylaria polymorpha (PERS. ex MER.) GREV. — Vielgestaltige Holzkeule

Fundorte: Schaan, 450 m, an *Prunus domestica*, WZ 1979-08-/, Li 3. — Schaanwald, Rüttiwald, 530 m (G 8): *Fraxinus excelsior*-Strunk, MFB + SP + RW 1980-09-28.

Erreger einer sehr aktiven Weissfäule in Strünken und Wurzeln, mitunter auch an abgestorbenen Teilen stehender Laubhölzer.

Familie **Diatrypaceae**

Diatrypella favacea (FR.) SACC.

Fundort: Triesen, Forst N Bachtobelröfe, 520—530 m (E 21): gemeinsam mit *Hypoxyton fuscum* an einem abgestorb. *Corylus avellana*-Stamm, HS 1979-10-01, Li 42.

Ein häufiger und weit verbreiteter Saprophyt an Betulaceen (inkl. *Corylus*). Zu achten wäre in Liechtenstein noch auf *Diatrypella quercina* an liegenden Eichenstämmen und auf *Diatrype disciformis* an Buchen.

«*Diatrype polycocca* FUCKEL»

Fundort: Von RICK (1903) vom Schellenberg (an *Fagus*) angegeben.

Familie **Diaporthaceae**

«*Diaporthe detrusa* (FF.) FCKL.»

Fundort: Von RICK (1903) auf dem Schellenberg an *Berberis* sp. angegeben.

«*Diaporthe longirostris* (TUL.) SACC.»

Fundort: Von RICK (1898 c) an Laubholz auf dem Schellenberg angegeben.