

Cylindrobasidium evolvens (FR.) JÜLICH

Fundorte: Balzers, Ellhorn, 490 m (A 25): liegd. *Sorbus aria*-Zweig, MFB+SP+WZ 1980-03-01, det. L. RYVARDEN & K. HJORTSTAM, Li 222. — Ruggeller Auenwald, Kanalmündung, 430 m (E 2): liegd. *Salix*-Strunk, MFB+SP+WZ 1980-03-01, det. L. RYVARDEN & K. HJORTSTAM, Li 242. — Vaduz, Zipfelwald, ca. 600 m (E 13): abgestorb. *Ligustrum vulgare*, EW 1980-02-/, Li 265.

Ein häufiger und weit verbreiteter Saprophyt an dünnen Laubholz-zweigen und -stämmchen.

Dacryobolus sudans (FR.) FR.

Fundort: Vaduz, Profatschengwald, 1140 m (F 15): an der Unterseite eines liegenden *Picea abies*-Stammes, MFB+SP 1980-09-28, Li 403.

An Rinde und Totholz von Koniferen, auch an verbautem Holz (Zäune etc.). Innerhalb des Areals von *Picea* weit verbreitet, doch nicht häufig.

Gloeocystidiellum lactescens (BERK.) BOID.

Fundort: Balzers, Auenwald, 480 m (B 23): Laubholz, HS 1979-09-13, det. S. MICHELITSCH, Li 24.

Saprophyt an Laubholz, seltener auch an Nadelholz. Nach ERIKSSON & RYVARDEN (1975: 424) eine eher wärmeliebende, in Skandinavien auf südliche Regionen beschränkte Art.

Gloeocystidiellum leucoxanthum (BRES.) BOID.

Fundort: Lawena, 1550 m (G 23): an Laubholz-Ast EW 1980-08-/, det. L. RYVARDEN & K. HJORTSTAM, Li 367.

Nach ERIKSSON & RYVARDEN (1975) eine nördliche, in Mitteleuropa montan bis subalpin verbreitete Art.

Hyphoderma radula (FR.) DONK — Reibeisenpilz

Fundorte: Vaduz, Über dem Schloss, 570 m (E 15): liegd. *Prunus avium*-Äste, EW 1980-04-/, Li 292. — Eschner Berg, Escherrüti, 950 m (E 6): liegd. *Prunus avium*-Äste, RW 1980-04-19, Li 325.

Saprophyt und Weissfäuleerreger an abgestorbenem Laubholz, nur vereinzelt auch an Nadelholz. Sehr gerne an toten Ästen von Kirschbäumen, wobei die «reibeisenartigen» Fruchtkörper meist auf der Borke wachsen.