

## **Stereum subtomentosum POUZ.** — Samtiger Schichtpilz

Fundorte (jeweils an liegenden Ästen oder Stämmen von *Alnus incana*): Balzers, Auenwald, 475 m (B 23), HS 1979-11-18, Li 142, 208. — Schaan, N Rheinbrücke Auenwald, 450 m (B 12), WZ 1979-12-09, Li 152, 164, 165. — Schaan, Unterau, 440 m (B 11), EW 1980-01-/ und 1980-03-/, Li 198, 279. — Bannriet Eschen, Tentschagraben, 440 m (B 9), EW 1980-03-/, Li 200. — Ruggeller Auenwald, Kanalmündung, 430 m (E 2), MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Gamprin-Bendern, Auenwald, 440 m (C 7), EW 1980-08-/, Li 373. — Eschen, Rheinau, 440 m (cf. C 8), EW 1980-03-/, Li 306. — Schaanwald, Rüttiwald, 530 m (G 8), MFB + SP + RW 1980-09-28. — An *Salix* in Balzers, Auenwald, HS 1980-05-14, Li 473.

Saprophyt und Weissfäuleerreger an Laubholz, bevorzugt an Erlen. Hauptsächlich in Auen- und feuchten Laubmischwäldern verbreitet. In den Auenwaldresten und Bachbegleitwäldern ein häufiger Pilz an abgestorbenem Erlenholz.

## Familie **Steccherinaceae**

### **Irpea lacteus (FR. ex FR.) FR.** — Milchweisser Eggenpilz

Fundorte: Balzers Ansstein, 800 m (D 24): liegd. *Fagus sylvatica*-Ast, WZ 1979-09-06, Li 8. — Ruggeller Riet, 430 m (F 3): abgestorb. *Frangula alnus*, MFB 1979-08-/, 1979-10-02, EW 1980-09-/, HS 1979-11-18, Li 2, 48, 450, 130. — Balzers, Auenwald, 475 m (B 23): *Alnus incana*-Ast, HS 1979-11-18, Li 134, 135. — Eschen, Bannriet, 440 m (B 9): abgestorb. *Frangula alnus*, EW 1979-12-02, Li 169. — Balzers, Ellhorn-Grat, 550 m (B 25): liegd. *Fraxinus excelsior*-Ast, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Ruggeller Auenwald, Kanalmündung, 430 m (E 2): liegd. *Alnus incana*-Ast, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Gamprin-Bendern, Auenwald, 440 m (C 7): liegd. *Populus* sp., EW 1980-02-/. — Eschner Berg, Lindholz, 580 m (F 6): liegd. *Prunus*-Ast, RW 1980-04-19, Li 329 b. — Schaan, Forstwald, 500 m (E 11): liegd. *Fagus sylvatica*-Ast, Unterseite, EW 1980-04-07, Li 322. — Triesen, Rheindamm, an abgestorb. *Frangula alnus*-Ast, EW 1980-06-/, Li 365.

Saprophyt und Weissfäuleerreger an Laubholz, gelegentlich auch Wundparasit. In Liechtenstein häufig in den Auenwaldresten an Faulbaum (Abb. 3). Nach RYVARDEN 1978: 251 eine südlich-kontinentale Art in Europa; holarktisch verbreitet.

### **Steccherinum fimbriatum (PERS. ex FR.) J. ERIKSS.**

Fundort: Von RICK (1898 b) als «*Odontia fimbriata* PERS.» an Laubholz im Saminatal angegeben.

Saprophyt und sehr aktiver Weissfäuleerreger an Totholz; häufig an abgefallenen Ästen.