

— Schellenberg, Haldenmäder, 435 m (F 5): *Fraxinus excelsior*-Strunk, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Balzers, Ellhorn-Grat, 650 m (B 25): *Fagus sylvatica*-Strunk, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Schaan, Forstwald, 520 — 560 m (E 11): *Abies alba*-Strunk, EW 1980-02-/. — Schellenberg, Eschnerrüti, 590 m (E 6): *Prunus avium*-Strunk, RW 1980-04-19, Li 328. — Schaan, Rheinauen, 450 m (B 12): Holzstrunk, EW 1980-03-/, Li 268. — Ruggell, Schneckenäule, 430 m (E 2/3): *Salix alba*, EW 1980-03-/, Li 315 a. — Schaan, Oberer Forst, 570 m (E 11): *Fraxinus excelsior*, WZ 1980-10-05, Li 430.

Saprophyt und Schwächeparasit an verschiedenen Laubhölzern, gelegentlich auch an Nadelholz anzutreffen; Weissfäuleerreger. Weltweit verbreitet. In Liechtenstein in den Rheintalebene und in den unteren Hanglagen häufig (Abb. 5).

### **Bjerkandera fumosa** (PERS. ex FR.) P. KARST. — Graugelber Rauchporling

Fundorte: Nendlerlüfe, 540 m (F 10): liegd. *Salix alba*-Stamm, MFB + SP 1979-11-17, Li 122. — Schaan, Auenwald N Rheinbrücke, 450 m (B 12): lebender, doch angemorschter *Salix*-Stamm, EW 1980-03-/, Li 276 b — Vaduz, Rheinau, 445 m (D 17): liegd. *Salix*-Stamm, 1980-03-/, Li 301. — Ruggell, Schneckenäule, 430 m (E 2/3): *Salix alba*, in 1 m Höhe, EW 1980-03-/, Li 315 b. — Schaanwald, Rüttiwald, 530 m (G 8): *Fraxinus excelsior*-Strunk, MFB + SP + RW 1980-09-28, Li 413. — Mauren, Bitsche, 620 m (G 12): Baumstrunk, EW 1980-11-/, Li 452.

Saprophyt an Laubholz, bevorzugt an Weiden, gelegentlich als Wundparasit an stehenden Stämmen zu beobachten. Gerne in Auenwäldern. Im allgemeinen viel seltener als die vorige Art (Abb. 5).

### **Ceriporia purpurea** (FR.) DONK

Fundort: Triesen, Rüfewald Garnis, 600 m (F 20): liegd. *Fagus sylvatica*-Ast, MFB+SP 1979-11-17, det. H. JAHN, Li 86. — Nendlerlüfe, 450 m (F 10): liegd. *Salix*-Ast, MFB+SP 1979-11-17, teste H. JAHN, Li 116.

Eine seltene, nach RYVARDEN (1976) kontinental verbreitete Art an totem Laubholz. Annähernd weltweit vorkommend.

### **Ceriporia reticulata** (FR.) DOM.

Fundorte: Triesen, Rüfewald Garnis, 600 m (F 20): liegd. *Fagus sylvatica*-Ast, MFB+SP 1979-11-17, Li 85. — Schaanwald, Rüttiwald, 530 m (G 8): liegd. *Alnus incana*-Stamm, unterseits, gemeinsam mit *Rigidoporus sanguinolentus*, MFB+SP+RW 1980-09-28, Li 417 b.

Holarktisch verbreiteter Saprophyt an morschen und sehr feuchten Laubhölzern, meist an der Unterseite liegender Äste.