

**Trametes zonatella** RYV. — Zonenporling  
Syn.: *Coriolus zonatus* (NEES ex FR.) QUEL.

F u n d o r t : Malbun, Heita, 1700 m (L 20): abgestorb. Stamm, MFB 1980-08-06, Li 340.

Ähnlich der vorigen Art, doch hauptsächlich in boreal-montanen Regionen und gerne an *Fagus sylvatica*.

**Trichaptum abietinus** (FR.) RYV. — Tannentramete  
Syn.: *Hirschioporus abietinus* (PERS. ex FR.) DONK

F u n d o r t e : Vaduz, Bara-Halde, 700 — 750 m (E 14): liegd. *Pinus sylvestris*-Ast, MFB + SP 1979-11-17, Li 107. — Balzers, Ellhorn, 600 m (A 25): liegd. *Pinus sylvestris*-Ast, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Schaan, Gafos, 570 m (F 12): liegd. *Larix decidua*-Ast, EW 1980-02-/. — Schaan, Forstwald, 520 — 560 m (E 11): liegd. *Abies alba*-Ast, EW 1980-02-/. — Schaan, Schwabbrünnen, 460 m (E 10): liegd. *Pinus sylvestris*-Ast, EW 1980-02-/. — Oberplanken, 970 m (F 11): liegd. *Abies alba*-Ast, EW 1980-02-/. — Silum, vom alten Tunnel zur Lattenhöhe, 1490 — 1770 m (G 16, 17): häufig an liegd. *Picea abies*-Stämmen und -Ästen, JPP + SP + RW + WZ 1980-09-27. — Gamprin, Lutzengütlekopf, 640 m (E 6): liegd. *Abies alba*-Stamm, MFB + SP + RW 1980-09-28. — Vaduz, Profatschengwald, 1190 m (F 15): liegd. *Pinus sylvestris*-Ast, MFB + SP 1980-09-28.

Häufiger und weit verbreiteter Saprophyt an Nadelholz, ganz selten auch an Laubholz (nach RYVARDEN 1978: 441); Weissfäuleerreger im Splint. Fast regelmässig an liegenden Nadelholzstämmen, oft zusammen mit *Stereum sanguinolentum* anzutreffen.

**Tyromyces caesius** (FR.) MURR. — Blauer Saftporling

F u n d o r t e : Sücka, Beim «Trögele» oberh. des alten Tunnels, 1480 m (H 18): liegd. *Larix decidua*-Stamm, Schnittfläche, WZ 1979-10-07, Li 50. — Triesen, Unter dem Magrüelstein, 500 m (E 22): liegd. *Picea abies*-Stamm, MFB + SP 1979-11-17. — Vaduz, Bannholz, 580 m (E 14): liegd. *Pinus sylvestris*-Ast, MFB + SP 1979-11-17. — Schellenberg, Haldenmäder, 435 m (F 5): abgestorb. *Picea abies*-Stamm, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Silum, vom alten Tunnel zur Lattenhöhe, 1490 u. 1800 m (G 15, H 18): liegd. *Picea abies*-Stämme, JPP + SP + RW + WZ 1980-09-27.

Saprophyt an morschem Nadelholz. Mitunter in Bergwäldern häufig an entrindeten und auf dem Boden liegenden Fichtenstämmen, aber auch an Strünken, liegenden Ästen, sogar an feuchtem Bauholz (Abb. 14). Braunfäuleerreger.