



Abb. 11: Fundorte und Höhenverbreitung von *Phellinus conchatus* (links) und *Phellinus punctatus* (rechts).

## Familie Ganodermataceae

### **Ganoderma applanatum** (PERS. ex S. F. GRAY) PAT. —

#### Flacher Lackporling

Fundorte: Auenwald zw. Schaan u. Bendorf, 440 m (cf. B 9): *Populus canadensis*-Strunk, EW 1980-01-/, Li 194. — Balzers, Ellhorn, 480 m (A 25): *Fagus sylvatica*-Strunk, MFB + SP + WZ 1980-03-01; EW 1980-10-/, Li 456; JPP 1979-09-02, Li 466. — Schaan, Forstwald, 520 — 560 m (E 11): *Fagus sylvatica*-Strunk, EW 1980-02-/, Li 260. — Schellenberg, Hinterer Gantenstein, 680 m (G 4): *Abies alba*-Strunk, EW 1980-03-/, Li 280. — Gamprin, 500 m (C 7): Laubholz, EW 1980-03-/, Li 309. — Schaanwald, Rüttwald, 540 m (G 8): *Fraxinus excelsior*-Strunk, MFB + SP + RW 1980-09-28. — Balzers (ohne nähere Angaben), an cf. *Juglans regia*, JPP 1979-09-02, Li 467. — Schaan, hinter der Fabrik HILTI, 485 m (E 11): *Fagus sylvatica*-Strunk, JPP 1979-09-/, Li 471.