

Collybia acervata (FR.) KARST.

Fundort: Von MURR (1922) auf dem Schellenberg angegeben. Saprophyt an Nadelholzstrünken.

Flammulina velutipes (CURT. ex FR.) SING. — Samtfussrübling

Fundorte: Nendlerlüfe, 450 m (F 10): *Alnus incana*-Strunk, MFB + SP 1979-11-17, Li 118. — Schaan, Auenwald N Rheinbrücke, 445 m (B 12): liegd. *Salix*-Ast, WZ 1979-12-09, Li 155. — Schaan-Vaduz, 500 m (D 14): Laubholz-Strunk, EW 1980-01-/, Li 216. — Ruggell, Auenwald, 430 m (E 2): abgestorb. *Sambucus nigra*-Stamm, EW 1980-02-15, Li 253. — Gamprin-Bendern, Auenwald, 440 m (C 7): abgestorb. *Populus*-Stamm, EW 1980-02-/. — Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) häufig an verschiedenem Laubholz auf dem Eschner und Maurer Berg.

Saprophyt und Wundparasit an Laubhölzern, Weissfäuleerreger im Splint. Die essbaren Fruchtkörper erscheinen vornehmlich im Winterhalbjahr, besonders in milden Wintern.

Geronema chrysophyllum (FR.) SING.

Fundort: Bargella, Lattenhöhe, 1780 m (G 15): *Pinus montana*, JPP 1980-09-27 (schriftl. Mitt.). Saprophyt an modrigen Nadelholzstrünken.

Marasmiellus ramealis (BULL. ex FR.) SING.

Fundorte: Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) in Liechtenstein an morschen Laub- und Nadelholz Zweigen häufig und weit verbreitet.

Marasmius androsaceus (L. ex FR.) FR. — Rosshaar-Schwindling

Fundort: Bargella, Lattenhöhe, 1780 m (G 15): liegd. *Picea abies*-Äste, JPP + SP + RW + WZ 1980-09-27, Li 386. Wirtschaftlich unbedeutend.

Micromphale foetidum (SOW. ex FR.) SING.

Fundort: Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) häufig an Laubholzästen in den Auenwäldern und am Eschner Berg.

Mycena galericulata (SCOP. ex FR.) S. F. GRAY

Rosablättriger Helmling

Fundorte: Schaanwald, Rütliwald, 540 m (G 8): liegd. *Fraxinus excelsior*-Stamm, MFB + RW + SP 1980-09-28. — Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) in Liechtenstein häufig an modrigem Holz in den Auenwaldresten, am Eschner Berg und am Maurer Berg.