

Familie **Pluteaceae**

Pluteus atricapillus (SECR.) SING. — Rehbrauner Dachpilz

F u n d o r t e : Schaanwald, Rütliwald, 530 m (G 8): liegd. morscher Laubholzstamm, MFB + RW + SP 1980-09-28. — Nach R. WIEDERIN in den liechtensteinischen Wäldern allorts und häufig anzutreffen. Saprophyt an Moderholz.

Pluteus atromarginatus (KONR.) KÜHN. —

Schwarzscheidiger Dachpilz

F u n d o r t e : Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) «an vielen Standorten» in Liechtenstein; an Nadelholzstrüngen.

Pluteus leoninus (SCHFF. ex FR.) KUMM. — Löwengelber Dachpilz

F u n d o r t : Von R. WIEDERIN bei Nendeln an einem Laubholzstrunk gefunden (schriftl. Mitt.).

Pluteus salicinus (PERS. ex FR.) KUMM. — Grauer Dachpilz

F u n d o r t : Schaanwald, Rütliwald, 540 m (G 8): liegd. Laubholz-Ast, RW 1980-09-06. Ohne wirtschaftliche Bedeutung.

Pluteus umbrosus (PERS. ex FR.) KUMM.

F u n d o r t : Von R. WIEDERIN auf dem Maurer Berg an *Fagus sylvatica*-Strunk gefunden (schriftl. Mitt.).

Familie **Coprinaceae**

Coprinus disseminatus (PERS. ex FR.) S. F. GRAY — Gesägter Tintling

F u n d o r t e : Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) verbreitet an Laubholz in den Auenwaldresten, auf dem Maurer und dem Eschner Berg. Häufig in dichten Rasen an morschen Strüngen.

Coprinus micaceus (BULL. ex FR.) FR. — Glimmer-Tintling

F u n d o r t e : In Liechtenstein weit verbreitet und häufig an morschen Laubholzstrüngen (nach R. WIEDERIN, schriftl. Mitt.).

Coprinus truncorum (SCHFF.) FR. — Weiden-Tintling

F u n d o r t e : Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) in den Auenwaldresten der Rheintalebene an morschem Weidenholz (*Salix* spp.).