

Fundorte: Von MURR (1918) auf dem Ellhorn angegeben. — Ellhorn, Balzers, 530 m (B 25): morsch. *Fagus sylvatica*-Strunk, EW 1980-06-, Li 363. — Ebenda, 620 m, an *Fraxinus excelsior*-Strunk, Li 366.

Saprophyt an Laubhölzern. Nach ROMAGNESI 1971 käme *C. mollis* bevorzugt in feucht-kühlen Laubwäldern über silikatischem Untergrund vor. Gerade die entgegengesetzten Standortbedingungen sind aber am Ellhorn anzutreffen: trocken-warme Reliktföhren- und Lindenmischwälder über karbonatischem Untergrund.

Crepidotus variabilis (PERS. ex FR.) QUEL. — Gemeiner Krüppelfuss

Fundorte: In Liechtenstein weit verbreitet und häufig auf verschiedenen Laubholzweigen. Beleg: Triesen, Rüfewald-Garnis, 600 m (F 20): *Crataegus oxyacantha*-Stämmchen, MFB + SP 1979-11-17, Li 95. Häufig auch im Ruggeller Riet an Zweigen von *Rhamnus frangula*. Wirtschaftlich bedeutungslos.

Familie **Cortinariaceae**

Galerina marginata (FR.) KÜHN.

Fundort: Bargella, Lattenhöhe, 1800 m (G 15): Wurzelstock von *Picea abies*, JPP + RW + SP + WZ 1980-09-27, Li 390. Saprophyt an modrigem Nadelholz.

Gymnopilus penetrans (FR. ex. FR.) MURR. —

Geflecktblättriger Flämmling

Fundort: Von J.-P. PRONGUE an einem *Pinus*-Stamm bei Planken gefunden (1980-10-05, schriftl. Mitt.).

Gymnopilus sapineus (FR.) MRE. — Tannen-Flämmling

Fundort: Nach R. WIEDERIN (schriftl. Mitt.) im Gebiet häufig an Fichtenstrünken (*Picea abies*).

Unterklasse GASTEROMYCETIDAE

Ordnung **Lycoperdales**

Familie **Lycoperdaceae**

Lycoperdon pyriforme SCHFF. ex FR. — Birnen-Stäubling

Fundorte: Maurer Berg, «Kirchenholz», 930 m (H 8): liegd. *Pinus sylvestris*-Stamm, GW 1979-10-16, Li 57. — Schellenberg, Hochrütti, 650 m (H 8): lebend.