

Oberhöhe des Bestandes: 20-22 m, eine Krautschicht ist nicht vorhanden.

Dem Bestand wurden früher nur Dürrständer entnommen. Eher ungesundes Bestandesbild, Rutschungen in unmittelbarer Umgebung, stark astige Bäume, Dürräste bis auf ca. 10 m.

Stichprobe Nr. 2, Brüchliswald, 480 m

Ca. 60-70 jähriger dichter Fichtenwald mit Tannenanteil, Pflanzung nach Kahlschlag, landwirtschaftliche Zwischennutzung, stellenweise Fichtenreinpflanzungen, ungeeignete Herkünfte.

	Fi	Ta	Es
Oberschicht 80-90	80	10	10
Mittelschicht 20	20		
Unterschicht -			

Oberhöhe: ca. 23 m, Dürräste bis über 10 m, Krautschicht: ca. 20%.

Schmale Kronen infolge mangelndem Lichtgenuss. Die letzte Dürrholzentnahme schon ca. 10 Jahre her. Eher labiles Bestandesbild. In weiterer Umgebung Windwurfschäden. Der Probenbestand ist beidseits von natürlich gewachsenen Fichtenbeständen umgeben. Die eingepflanzte Weymouth-Föhre ist abgestorben. Stellenweise Tannen-Versamung festzustellen.