

32. *Myriophyllum spicatum* im kleinen Montikler See bei Eppan. — Verh. zool. bot. Ges. Wien VIII. Bd. 1858 Sitzungsber. p. 71.
 Apführung von daran haftenden Algen, nach den Bestimmungen Grunows.
33. Die Laubmoose der österreichischen Torfmoore. — Verh. zool. bot. Ges. Wien VIII. Bd. 1858 p. 317—320. — Reimpr.: *Bonplandia* VIII. Jg. 1860 p. 291—293.
 Mit mehreren Standorten aus Tirol.
34. *Cirsium Portae* Hausm., von Porta im Val Vestino gesammelt. — Verh. zool. bot. Ges. Wien IX. Bd. 1859 Sitzungsber. p. 125.
35. Beitrag zu einer Lebensgeschichte Sendtner's. Aus dessen Briefen gesammelt und erläutert. — Verh. zool. bot. Ges. Wien IX. Bd. 1859 p. 103—118.
 p. 104—108 eine Zusammenstellung der von Dr. Otto Sendtner und Dr. Kummer u. a. in Tirol gesammelten Phanerogamen; p. 108 Notiz über Sendtner's Sauteriana; p. 112 u. 113 vereinzelte Moosstandorte; ausser dem Notizen über Forschungen Sendtner's in Tirol.
36. Die Verbreitung von *Asplenium fissum* Kit. — Verh. zool. bot. Ges. Wien IX. Bd. 1859 p. 309—312; Taf. V. — Reimpr.: *Bonplandia* VIII. Jg. 1860 p. 317—319.
 Tirol: im Vallarsa- und Ronchithale nach Leybold.
37. Untersuchungen über die Hypneen Tirols. — Verh. zool. bot. Ges. Wien X. Bd. 1860 p. 383—502. — Sep.: Wien, W. Braumüller. 1860. 8°. 120 p. — Ref.: *Bonplandia* VIII. Jg. 1860 p. 315—316.
 Bearbeitung dieser Pflanzenfamilie als Bruchstück einer vom Verfasser projectierten Kryptogamenflora des Landes.
38. Eine Europäische *Myurella* oder zwei? Ein bryologischer Excurs. — Oesterr. bot. Zeitschr. X. Jg. 1860 p. 141—143. — Reimpr.: *Bonplandia* VIII. Jg. 1860 p. 264—265.
 Mit Angabe der für Tirol festgestellten Verbreitung von *M. julacea* (Vill.), wozu *M. apiculata* (Hübener) als blosse Standortsform gezogen wird.
39. Nachtrag zu den „Untersuchungen über die Hypneen Tirols“. — *Bonplandia* IX. Jg. 1861 p. 192—193.
 Verzeichnet Funde aus der Gegend von Kufstein von Juratzka; dann aus Südtirol von Hausmann, Molendo, Porta, Venturi.
40. Dreimal arretirt. Autobiographische Mittheilung eines botanisirenden Naturfreundes. — Oesterr. bot. Zeitschr. XVIII. Jg. 1868 p. 50—55.
 p. 51: *Cronartium flaccidum* bei Kufstein.
41. Botanische Notiz. — *Flora* LII. Jg. 1869 p. 495.
Pyronema Marianum bei Castelfondo.
42. Die angeblichen Fundorte von *Hymenophyllum tunbridgense* Sm. im Gebiete des adriatischen Meeres. — Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. Bd. 1870 p. 571—588.
 Resultat für das Gebiet: Die Angabe von Van der Bosch Nr. 1, Sep. Abdr. p. 63: »Südtirol« kann zwar nicht mit Sicherheit in Abrede gestellt werden; dessen Bestätigung aber erscheint sehr wünschenswert.
43. Die Entdeckung des *Aecidium*s von *Uromyces Calaciae* Ung. — Oesterr. bot. Zeitschr. XX. Jg. 1870 p. 65—67.
 Anführung der für die drei Generationen von *Uromyces Calaciae* in der Monarchie beobachteten Standorte (Stylosporen und Teleutosporen in Tirol).