

10. Ueber die Früchte und Samen der *Lloydia*. — *Flora* XIX. Jg. 1836 p. 185—187.
Standort: Sulden.
- 11^a. *Synopsis florum germanicæ et helveticæ, exhibens stirpes phanerogamas rite cognitæ, quæ in Germania, Helvetia, Borussia et Istria sponte crescunt atque in hominum usum copiosius coluntur, secundum systema Candolleianum digestas, præmissa generum dispositione secundum classes et ordines systematis Linneani conscripta.* Francofurti a/M, F. Wilmanns. 1837. 8°. LX, 844 p. Index generum specierum et synonymorum *ibid.* 1838. 8°. 102 p. — Ed. II. Leipzig, Gebhardt und O. Reiland. 1843—1845. 8°. LX, 1164 p. — Ed. III. *ibid.* 1857. 8°. XLVIII, 875 p.
Siehe Naegeli C. Nr. 1.
- 11^b. *Deutsche Uebersetzung: Synopsis der deutschen und schweizer Flora, enthaltend die genauer bekannten phanerogamischen Gewächse, welche in Deutschland, der Schweiz, in Preussen und Istrien wild wachsen und derjenigen, welche zum Gebrauche der Menschen in grösserer Menge gebauet werden, nach dem De Candolle'schen Systeme geordnet mit einer vorangehenden Uebersicht der Gattungen nach den Classen und Ordnungen des Linneischen Systemes.* Zwei Abtheilungen. Frankfurt a/M., F. Wilmanns. 1837—38. 8°. VIII, 840 p. Register der Gattungen, Arten und Synonyme *ibid.* 101 p. — 2. Aufl. Leipzig, Gebhardt und O. Reiland. 1846—47. 8°. LXVIII, 1210 p.
- 11^c. *Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora.* 3. Auflage herausgegeben von E. Hallier, fortgesetzt von R. Wohlfarth. Leipzig, O. Reiland. 1890—1897. 8°. I. Bd. 1890—1892. 960 p. II. Bd. 1892 — (im Erscheinen).
Siehe Wohlfarth R. Nr. 2 und Borbás A. v. Nr. 27.
Tirol nach Elsmann, Frölich, Funck, Host, Ant. Sauter, Zuccarini; grösstentheils auf Grund der vorhandenen Litteratur; bemerkenswerter sind Originalbeiträge von Facchini, welche zuerst in 11a ed. II. erscheinen, dann Einzelnes von Hausmann.
12. *Zusätze und Verbesserungen zu meiner [später „zur“] Synopsis Floræ germanicæ et helveticæ.* — *Flora* XXI. Jg. 1838 p. 1—15, 23—32; XXIII. Jg. 1840 p. 353—363, 369—375; XXIV. Jg. 1841 p. 417—432, 433—448, 449—464, 465—480, 481—494, 497—512, 513—528.
Mehrfach wird Tirol erwähnt.
13. *Bupleurum baldense* Waldst. & Kitl., eine von Herrn Assessor Tommasini für Deutschlands Flora von Neuem aufgefundenen Pflanze, näher erörtert. — *Flora* XXII. Jg. 1839 p. 216—221.
p. 217: Monte Baldo.
14. Ueber die *Polygala Buxi minoris folio* Vaillant. — *Flora* XXII. Jg. 1839 p. 225—233.
p. 229: *P. amara* aus Tirol.
15. Correspondenz aus Erlangen: Ueber *Cherleria sedoides*. — *Flora* XXIV. Jg. 1841 p. 63—64.
Das bezügliche Exemplar stammt von Traunsteiner, also aus der Flora von Kitzbühel.