

**U** Zillertal: an einem faulen Strunke in der Gerlosklamm bei Zell (Handel-Mazzetti in litt., teste Bres.).

— *L. violaceum* Rostaf. — Lister p. 129.

Var. *Sauteri* (Rostaf.), *L. Sauteri* Rostaf. Monogr. (1875) p. 205, *L. violaceum* ♂ *Sauteri* Lister. — Lister p. 129.

»Prope Salzburg Tyroliae (Sauter)« (Sacc. 9 VII. p. 392) und »Tyrol« (Lister l. c. p. 130). — Rostafinski l. c. p. 205 selbst sagt jedoch: »Raz tylko znaleziony przez Sautera w okolicach Salzburga« — und es beruhen daher auch obige Angaben zweifellos auf Mißverständnis.

### 13. Liudbladia Fr.

1. (24.) *L. tubulina* Fr. — Lister p. 137.

**I** Gschnitztal: auf einem Lärchenstrunke am Fuße des Blaser gegen Außer-Pirchet 1400 m (Sarnth., det. Bres.).

## 6. Fam. Cribariaceae.

### 14. Cribaria Pers.

1. (25.) *C. rufa* (Roth) Rostaf., *Stemonitis rufa* Roth (1788), *Cribaria rufescens* Pers. (1794), *C. fulva* Schrad. (1797). — Lister p. 140.

Auf modernden Baumstrünken.

**R** Valle Lagarina (Cob. 3 p. 584 als *C. fulva*).

2. (26.) *C. aurantiaca* Schrad., *C. vulgaris* Schrad. — Lister p. 142.

Auf moderndem Holze.

**B** Am Schlern (Racib.!).

3. (27.) *C. microcarpa* (Schrad.) Pers., *Dictyodium microcarpum* Schrad. — Lister p. 146.

Auf faulem Holze.

**R** Valle Lagarina (Cob. 3 p. 584).

## 7. Fam. Tubulinaceae.

### 15. Tubulina Pers.

1. (28.) *T. fragiformis* Pers. (1794), *Sphaerocarpus cylindricus* Bull. (1801), *Tubulina cylindrica* Lam. et DC. — Lister p. 153.

**O** Oetztal: auf einem Lärchenstrunke am Acherkogel (Höhnle).

**I** Innsbruck: im Iglerwalde (Stolz!).

**U** Mühlgraben bei Erl (Schnabl).

**M** Im Suldentale (Höhnle).

**D** Tauern: bei Gschlöß (Höhnle).