

8. Fam. Reticulariaceae.

16. Reticularia Bull.

1. (29.)
- R. lycoperdon*
- Bull.,
- R. umbrina*
- Fr. — Lister p. 160.

I An einer Buche im Achentale (Brehm!).**K** An alten Nadelholzstämmen (Ung. 8 p. 228).**P** Bei Bruneck (Moewes!).

9. Fam. Trichiaceae.

17. Trichia Haller.

1. (30.)
- T. favoginea*
- (Batsch) Pers.,
- Lycoperdon favogineum*
- Batsch (1786),
- Sphaerocarpus chrysospermus*
- Bull. (1791),
- Trichia chrysosperma*
- DC.,
- T. turbinata*
- With. (gehört nach Cooke,
- Myxomycetes of Great Brit.*
- (1877) p. 65 hieher). — Lister p. 163.

I Auf einem faulen Holzstamme im Voldertale (Leithe 2 p. 12); Gschnitztal: Trins (Wettst.).**K** Kitzbühel: in hohlen Baumstämmen bei Aurach (Ung. 8 p. 229 als *Trichia turbinata*).**B** Am Schlern (Racib.); Bozen: auf faulem Laubholze in Kühbach (Krav. 1 p. 15 als *Trichia turbinata*).

2. (31.)
- T. fallax*
- Pers. — Lister p. 170.

Auf modernem Holze.

I Bei Innsbruck (Zainer!).**K** Bei Hochfilzen (Höhnel).**B** Am Schlern (Racib.).

3. (32.)
- T. botrytis*
- Pers. (1794),
- T. pyriformis*
- Fr. (1829). — Lister p. 171.

K Kitzbühel: an morschen Baumstrünken im Buchwalde (Ung. 8 p. 229); bei Hochfilzen (Höhnel).

18. Hemitrichia Rostaf. (1873).

(Hemiarcyria Rostaf. (1875)).

1. (33.)
- H. rubiformis*
- (Pers.) Lister,
- Trichia rubiformis*
- Pers.,
- Hemiarcyria rubiformis*
- Rostaf. — Lister p. 175.

I Bei Innsbruck auf morschem Holze (Zainer!).**K** Kitzbühel: auf faulem Buchenholze im Buchwalde (Ung. 8 p. 229).

2. (34.)
- H. clavata*
- (Pers.) Rostaf. (1873),
- Trichia clavata*
- Pers.,
- Hemiarcyria clavata*
- Rostaf. (1875). — Lister p. 177.

Auf modernem Holze.

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 240; 2 p. 23).

3. (35.)
- H. serpula*
- (Scop.) Rostaf.,
- Mucor Serpula*
- Scop.,
- Trichia Serpula*
- Pers.,
- T. reticulata*
- Pers.,
- T. Serpula*
- var.
- reticulata*
- Fr. — Lister p. 179.