

und Neumarkt (Krav. 1 p. 15, soweit nicht die Pflanze auf „*Ervum hirsutum*“ einbegriffen ist).

T Auf *L. niger* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 382).

Auf *Vicia*-Arten.

I Auf *V. sepium* beim Hußlhof bei Willen (Stolz!), auf *V. faba* um Innsbruck (Stolz), bei Thaur und Hall (Peyr. b. Magn. 12 p. 36!).

U Auf *V. faba* am Achensee (Magn.!). auf *V. sepium* bei Kufstein (Dietel).

K Auf *V. faba*, *V. sativa* und *V. segetalis* (Ung. 8 p. 214, 216 als *Uredo Leguminosarum* DC. und *Uromyces appendiculata* Ung.).

B Auf *V. sepium* bei St. Peter im Villnöstale (Kabát b. Bubák 3 p. 293); auf *V. Gerardii* auf dem Mendelgebirge (H. & P. Syd. 1 p. 13; Syd. 4 Nr. 1456).

T Auf *V. faba* bei San Michele (Mach b. Thümen 4 Nr. 1130!); wird in Südtirol vielfach mit Kupfervitriol behandelt (Samek 2 p. 71).

47. (234.) **U. Pisi** (Pers.) Schroet. in Hedwigia XIV. (1875) p. 98. *Uredo appendiculata* β Pisi Pers. — Rbh. I. p. 163 Nr. 218.

a) Das Aecidium: *Aecidium Euphorbiae* (Schrank) Gmel. (1791), *Lycoperdon Euphorbiae* Schrank, Baier. Fl. (1789) p. 631. — Rbh. I. p. 261 Nr. 417. — Auf *Euphorbia cyparissias*.

I Innsbruck: bei Kranebitten, Hötting, bei der Weiherburg, am Wege zum Spitzbühel (Peyr. b. Magn. 12 p. 37!), unter der Straße nach Völs (Heinricher!), am Paschberg, bei Amras (Peyr. l. c.!), Hall, am Aufstiege zum Volderbade (Schiederm. 1 p. 194).

M Meran: in der Naifschlucht, am Tappeinerwege und im Passeiertale (Bäumler!).

E Gossensaß, über dem Ibsenplatze (Magn.!).

B Bozen (Hsm. nach Hfl. 51); Neumarkt (Krav. 1 p. 15).

b) *Uredo* und *Teleutosporen*. — Auf *Papilionaceen*.

V Bei Feldkirch, häufig (Rick 1 p. 18).

I Innsbruck: auf *Lathyrus pratensis* im Höttinger Graben und unter dem Peterbrünnl (Stolz!), auf *Vicia cracca* in der Innau daselbst, auf *Lathyrus pratensis* am Berg Isel (Peyr. b. Magn. 12 p. 37!), auf *L. silvester* bei Patsch (Stolz!).

M Auf *Lathyrus pratensis* am Ufer der Passer bei Meran (Magn. b. Sarnth. 3^c p. 352!).

B Auf *Lathyrus pratensis*, *Pisum sativum* und *Vicia cracca* bei Bozen und Neumarkt (Krav. 1 p. 15).

48. (235.) **U. Medicaginis falcatae** (DC.) Wint., *Uredo Fabae* η *Medicaginis falcatae* DC., *Uromyces striatus* Schroet. — Rbh. I. p. 159 Nr. 212.

Auf *Trifolien*.

I Innsbruck: auf *Medicago falcata* an der Straße zwischen Kranebitten und Zirl häufig, auf *M. minima* auf dem Friedhofe bei der Weiherburg (Peyr. b. Magn. 12 p. 37!), auf *Lotus corniculatus* am Judenbühel bei Mühlau (Stolz!); auf *M. lupulina* am Blaser (Magn.!).

M Das Aecidium auf *Euphorbia cyparissias* bei Trafoi und Franzenshöhe (Dietel); auf *Medicago lupulina* in Untermais bei Meran (Magn.!).