

7. (431.) *M. reticulatae* Blytt in Christiania Vidensk. Selsk. Förh. 1896 Nr. 6 p. 65.

Auf *Salix reticulata*.

**L** Am Obermädelejoch im Lechtale (Bornm.).

**O** Im Fimbertale in Paznaun (Peyr. b. Magn. 12 p. 53 als *M. epitea*!).

**I** Gschnitztal: bei Trins (Magn.!), im Martartale (Sarnth.).

**K** In Tonschieferalpen um Kitzbühel (Ung. 4 p. 99; 8 p. 215 als *Uredo Salicis* DC.).

**M** Franzenshöhe am Stilfserjoch (Peyr. b. Magn. 12 p. 53 als *M. epitea*!); bei Sulden (Magn.!: Jaap 1 p. 137); am Kuhberg (Magn.!).

**E** Am Schlüsseljoch, Brennerseite 21—2200 m (Sarnth.).

**N** Auf dem Monte Roën im Mendelgebirge (Magn.!).

[**R** Monte Baldo: im Val delle Pietre (C. Mass. 3 p. 235), extra fines.]

8. (432.) *M. alpina* Juel in Oefvers. Vetensk.-Akad. Förhandl. LI. (1894) Nr. 8 p. 417.

Auf *Salix herbacea*; das dazugehörige *Caeoma* auf *Saxifraga oppositifolia*.

**O** Bei Galtür in Paznaun (Lindau!).

**I** Am Roßkogel (Stolz!).

**K** Am Jufen bei Kitzbühel (Ung. 4 p. 99; 8 p. 215 als *Uredo Salicis* DC.).

**M** An der Stilfserjochstraße (Peyr. b. Magn. 12 p. 53 als *M. arctica*!); bei Sulden (Jaap!); das *Caeoma* am Stilfserjoch (Dietel; Pazschke).

[**P** Am Monte Piano bei Schluderbach (Bornm.), extra fines.]

**D** Am Helm in Sexten (Bornm.).

9. (433.) *M. repentis* Plowr. in Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. I. (1891) p. 131, *Uredo confluens* γ *Orchidis* Alb. et Schw., *Caeoma Orchidum* Link, *C. Orchidis* Wint., *Uredo Orchidis* Mart. — Rbh. I. p. 256 Nr. 398 (das *Caeoma*).

Auf *Salix repens*; das *Caeoma* auf *Orchis*-Arten.

**K** Bei Kitzbühel (die Nährpflanze im Torfmoore des Bichlach); das *Caeoma* auf *Orchis latifolia* einmal bei Reith gefunden (Ung. 4 p. 101; 8 p. 215 als *Uredo Salicis* und *Sclerotium salicinum* [letzterer Name bezeichnet die Teleutosporenlager], p. 212 als *U. Orchidis*, siehe auch p. 296).

10. (434.) *M. Ribesii-purpureae* Klebahn in Jahrb. f. wissensch. Bot. XXXV. (1901) p. 660, *Uredo confluens* α *Ribis alpini* Pers., *Caeoma Ribis alpini* Wint., *C. Ribesii* Link, *Uredo circinalis* Strauß. — Rbh. I. p. 258 Nr. 408 (das *Caeoma*).

Auf *Salix purpurea*; das *Caeoma* auf *Ribes*-Arten.

**L** Am Ufer des Plansee (Magn.!).

**O** Bei Landeck (Jaap 1 p. 137!); zwischen Imst und Starkenberg; bei Tumpen im Oetztale (Magn.!).

**I** Im Gschnitztale (Magn.!); bei Gries am Brenner (Bornm.).

**K** Um Kitzbühel (Ung. 4 p. 103; 8 p. 215 als *U. Salicis*, auf *S. monandra* [= *S. purpurea*]: wahrscheinlich hiehergehörig); das