

89. *Gyrocephalus* Bref.

(Guepinia Fr.)

1. (503.) *G. rufus* (Jacq.) Bref., Unters. a. d. Gesamtgeb. d. Mykol. VII. (1888) p. 131. *Tremella rufa* Jacq. (1778), *Guepinia rufa* Patouill., *Tremella helvelloides* DC. (1815), *Guepinia helvelloides* Fr. — Fr. p. 697; Rbh. I. p. 281 Nr. 475; Bres., *Funghi mang.* p. 211 tab. 103.

In Nadelholzwäldern an feuchten Orten.

V Feldkirch: im Herbst allenthalben an schattigen Stellen auf Lehm Boden und Holz (Rick 1 p. 18).

O Bei Nauders (Bail 2 Nr. 56, p. 106); bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 474), bei Oetz (Höhnel).

I Bei Innsbruck (Bail 1 Nr. 56, p. 106; Zainer!); im Stubaitale (Kern.); auf Holzstückchen im Padastertale bei Steinach (H. & P. Syd. 1 p. 11); häufig im Kalkgebiete um Trins bei 12–1500 m (Kern. 78^a Nr. 766, 78^b II. p. 164; Magn.; Sarnth. 8 p. 412; 11 p. 474), bei Gschnitz (Sarnth.).

U Achenal (Brehm), unter der Gföllalpe (Hieronymus!); Rattenberg, 600 m; Zillertal: in einer Erlenau vor Mayrhofen (Sarnth. 11 p. 474).

K Bei Kössen (Schnabl).

B Ratzes: an einer feuchten Stelle beim Badhause, ein Exemplar (Milde 29 p. 8, 21), im Hauensteiner Walde daselbst (Krav. 1 p. 10); in Karerwalde (Magn.); Ueberetsch: bei Matschatsch (Pfaff).

T Valle di Sella bei Borgo (Ambr. 12 p. 44).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 20), Serrada (Cob. 9 p. 34).

Im italienischen Tirol: „Reclagne“, „Reccia di lever“ (Bres. 7 1899 p. 421; 8 p. 111).

90. *Naematelia* Fr.

1. (504.) *N. encephala* (Willd.) Fr., *Tremella encephala* Willd. — Fr. p. 696; Rbh. I. p. 282 Nr. 480.

V Feldkirch: auf Tannenholz bei Tosters und Göfis (Rick 2 p. 135).

L An *Pinus* am Plansee (Schnabl).

I An Lärchenrinde (Zainer!); an Zäunen in Sellrain; Voldertal Stolz!; Trins: an Fichtenstangen eines Zaunes unter dem Muliboden (Sarnth.).

R Valle Lagarina (Cob. 3 p. 583).

2. (505.) *N. virescens* (Schum.) Corda, *Tremella virescens* Schum. — Fr. p. 696; Rbh. I. p. 282 Nr. 478.

V Feldkirch: an Tannenholz bei Garina (Rick 2 p. 135).

91. *Exidia* Fr.

1. (506.) *E. gelatinosa* (Bull.) Schroet, in Cohn, *Krypt.-Fl. Schles.* III. 1 p. 391 (1888), *Peziza gelatinosa* Bull. (1791), *Tremella recisa* Ditmar (1813), *Exidia recisa* Fr. — Fr. p. 693; Rbh. I. p. 284 Nr. 484.

V Feldkirch: an Weidenzweigen bei Tosters (Rick 2 p. 135).

I Innsbruck: auf *Salix grandifolia* in der Kranebitter Klamm (Sarnth.); auf *Salix* sp. in der Sillschlucht unter der Viller Straße (Sarnth.).