

10. (558.) *C. fragilis* Holmsk. — Fr. p. 675; Rbh. I. p. 307 Nr. 559.

In Wäldern.

V Feldkirch: im Göffiser Wald (Rick 1 p. 19).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 19).

11. (559.) *C. inaequalis* Müll. — Fr. p. 674; Rbh. I. p. 308 Nr. 562.

K Bei Westendorf (Höhnel); Kitzbühel: auf morschem Holze am Stege bei Grub (Ung. 8 p. 234).

12. (560.) *C. fusiformis* Sow. — Fr. p. 674; Rbh. I. p. 308 Nr. 563.

Auf Grasplätzen.

V Feldkirch: am Aelpele (Rick 1 p. 19).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 19).

13. (561.) *C. dendroidea* Fr., Monogr. Hymen. II. (1863) p. 281. — Fr. p. 673.

R Valle Lagarina (Cob. 3 p. 583).

14. (562.) *C. apiculata* Fr. — Fr. p. 673; Rbh. I. p. 310 Nr. 570.

V Feldkirch: in Reichenfeld und am Stadtschrofen (Rick 1 p. 19).

15. (563.) *C. pallida* Schaeff. — Rbh. I. p. 310 Nr. 571 (als Synonym von *C. stricta*).

V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 2 p. 135).

O Wälder bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 474).

In Wäldern des italienischen Tirol (Bres. 7 1899 p. 420—421; 8 p. 110).

16. (564.) *C. gracilis* Pers. — Fr. p. 672; Rbh. I. p. 310 Nr. 572.

V Feldkirch: am Ardetzenberg (Rick 1 p. 19).

V Valle Lagarina (Cob. 2 p. 19).

17. (565.) *C. palmata* Pers. — Fr. p. 672; Rbh. I. p. 310 Nr. 573.

O In den Wäldern bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 474).

18. (566.) *C. condensata* Fr. — Fr. p. 672; Rbh. I. p. 310 Nr. 574; Bres., Fungi trid. I, p. 90 tab. 101.

In Fichten- und Laubwäldern.

V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 1 p. 19).

N Val di Sole (Bres. 2 p. 69).

Im italienischen Tirol (Bres. 1 I. p. 90).

19. (567.) *C. suecica* Fr. — Fr. p. 672; Rbh. I. p. 311 Nr. 575.

V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 1 p. 19).

20. (568.) *C. fennica* Karst. in Notiser soc. fauna et fl. fenn. IX. (1868) p. 372, Bres., Fungi trid. I. p. 24 tab. 28 (1882). — Fr. p. 672.

N Valle di Sole, in schattigen Nadelwäldern, sehr selten (Bres. 1 p. 24; 2 p. 69).