

31. (579.) *C. epichnoa* Fr. — Fr. p. 670; Rbh. I. p. 313 Nr. 585.
V Feldkirch: auf faulem Holze, zerstreut (Rick 1 p. 19).
32. (580.) *C. delicata* Fr. — Fr. p. 670; Rbh. I. p. 313 Nr. 586.
V Feldkirch: Reichenfeld (Rick 1 p. 18).
33. (581.) *C. virgata* Fr. — Fr. p. 670; Rbh. I. p. 313 Nr. 588.
V Feldkirch: im Walde bei Maria Grün (Rick 1 p. 19).
34. (582.) *C. subtilis* Pers. — Fr. p. 669; Rbh. I. p. 314 Nr. 590.
 In Laub- und gemischten Wäldern.
R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 19).
35. (583.) *C. Patouillardii* Bres., Fung. trid. II. p. 39 tab. 146 (1892).
T In Laubgehölzen bei Trient (Bres. 1 II. p. 40).
36. (584.) *C. alpina* Saut. in Flora XXIV. (1841) p. 316. —
 Rbh. I. p. 317.
K In finsternen Erdhöhlen am Geisstein bei 1790 m, August 1839
 (Saut. 18 p. 317).
37. (585.) *C. Kunzei* Fr. — Fr. p. 669; Rbh. I. p. 314 Nr. 591.
I Bei Trins im Gschnitztale (Wettst.).
K In Nadelwäldern auf der Erde, selten (Ung. 8 p. 234).
38. (586.) *C. Krombholzii* Fr., *C. grossa* Pers. p. p. — Fr. p. 669;
 Rbh. I. p. 314 Nr. 592.
K Bei Hochfilzen (Höhnel).
39. (587.) *C. grossa* Pers. — Rbh. I. p. 314 Nr. 592 (als Synonym
 von *C. Krombholzii*).
I Innsbruck: in Wäldern am Paschberg (Sarnth. 11 p. 474).
40. (588.) *C. rugosa* Bull. — Fr. p. 669; Rbh. I. p. 314 Nr. 593.
 In Wäldern, Baumgärten etc. an feuchten Stellen.
V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 1 p. 19).
I Bei Trins im Gschnitztale (Wettst.).
K Bei Hochfilzen (Höhnel).
41. (589.) *C. cristata* (Holmsk.) Pers., *Ramaria cristata* Holmsk.
 (1790). — Fr. p. 668; Rbh. I. p. 315 Nr. 594.
 In Laub- und Nadelholzwäldern.
V Feldkirch, häufig (Rick 1 p. 18).
I Bei Trins im Gschnitztale (Wettst.).
K Bei Westendorf und Hochfilzen (Höhnel).
R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 238; 2 p. 19).
42. (590.) *C. cinerea* Bull. — Fr. p. 668; Rbh. I. p. 315 Nr. 595.
V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 4 p. 324).
I Innsbruck: am Paschberg (Stolz!); bei Trins (Wettst.).
R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 238; 2 p. 19).