

8. (665.) *St. insignitum* Quél. in Compt. rend. assoc. fr. avanc. sc. 1889 p. 513, Sacc., Syll. fung. IX, (1891) p. 226.

U An einem abgestorbenen Laubholzstamme unterhalb Aschau im Brandenbertale (Sarnth.).

9. (666.) *St. purpureum* Pers., *Thelephora purpurea* Schum. — Fr. p. 639; Rbh. I. p. 345 Nr. 708.

V Feldkirch: gemein an Laubholz (Rick 1 p. 19).

I Innsbruck: auf *Alnus incana* am Gramartboden (Sarnth.), auf *Populus tremula* ober dem Peterbrünnl, auf *Betula* beim Hußlhof, an Baumstrünken am Paschberg (Stolz!); auf *Corylus* vor Gschnitz (Sarnth.).

U Am Hirnschnitte aufgeschichteter Buchenscheiter bei Achenkirch (Sarnth.).

K Gemein an morschen Buchenästen u. s. w. (Ung. 8 p. 235).

M Auf *Salix babylonica* in einem Garten in Meran (Magn.).

E Brixen: zwischen Sarns und Albeins (Sarnth. Hb. F.).

R Valle Lagarina (Cob. 3 p. 583).

Für Tirol schon von Pollini 3 III. (1824) p. 574 angegeben.

10. (667.) *St. album* Quél. in Compt. rend. assoc. franç. avanc. sc. 1880 p. 675 tab. 11, Sacc., Syll. fung. VI. (1888) p. 571.

I An einem liegenden Erlenstamme in den Auen zwischen Trins und Gschnitz, ca. 1220 m (Sarnth.).

11. (668.) *St. ochroleucum* Fr., *Thelephora ochroleuca* Fr., Syst. I. (1821) p. 440, *Corticium ochroleucum* Fr. (1838), *Stereum ochroleucum* Fr. (1874). — Fr. p. 639; Rbh. I. p. 346 Nr. 709.

K Kitzbühel: an faulem Fichtenholze bei Bachern (Ung. 8 p. 235).

12. (669.) *St. acerinum* (Pers.) Sacc. in Atti soc. veneto-trent. II. (1873) p. 63, *Thelephora acerina* Pers. — Fr. p. 645; Rbh. I. p. 346.

K Auf der Rinde mehrerer Bäume, z. B. Bergahorns (Ung. 8 p. 235).

13. (670.) *St. gausapatum* Fr., *Thelephora gausapata* Fr., Elench. I. (1828) p. 171, *Stereum gausapatum* Fr., Hymen. eur. (1874) p. 638.

V Feldkirch: an *Quercus* am Känzele (Rick 3 p. 340).

116. *Lloydella* Bres.

1. (671.) *L. striata* (Schrad.) Bres. b. Lloyd, Mycol. Notes Nr. 6 Cincinnati 1901 p. 51, *Thelephora striata* Schrad. (1794), *Stereum striatum* Fr., *Thelephora abietina* Pers. (1807), *Stereum abietinum* Fr., *St. glaucescens* Fr. (1874). — Fr. p. 641 (*St. striatum*), p. 643 (*St. abietinum*), p. 644 (*St. glaucescens*); Rbh. I. p. 343 Nr. 698.

Nach Bresadola, der in C. G. Lloyd, l. c. p. 51 das Genus *Lloydella* durch die im Hymenium auftretenden Cystiden von *Stereum* unterscheidet, ist *Thelephora striata* Schrad., *Th. abietina* Pers. und *Stereum glaucescens* Fr. identisch.

V Feldkirch: an Nadelholz bei Amerlügen (Rick 1 p. 19).

T An Stämmen von *Abies alba* bei Trient (Bres. in Hb. Mus. bot. herol.).