

14. (813.) *P. marginatus* Fr. — Fr. p. 561; Rbh. I. p. 422 Nr. 978.
V Feldkirch: an Laubholz am Ardetzenberg (Rick 1 p. 20).

15. (814.) *P. ungulatus* (Schaeff.) Sacc. in *Michelia* I. p. 539 (1879). *Boletus ungulatus* Schaeff., *Fungi Bav. ic. II. tab. 137* (1763). *Fomes ungulatus* Sacc., *Syll. fung. VI. (1888) p. 167*. *Boletus pinicola* Swartz (1810). *Polyporus pinicola* Fr. — Fr. p. 561; Rbh. I. p. 422 Nr. 979.

P. pinicola und *P. ungulatus* sind nach Bresadola synonym; auch Saccardo bemerkt l. c. p. 167, daß *F. ungulatus* vielleicht nur var. *ungulata sulcato-zonata* des *F. pinicola* Fr. ist.

V Feldkirch: an Tannen in Reichenfeld, auch sonst nicht selten (Rick 1 p. 20).

O An Fichte bei Tumpen im Oetztales (Höhnel).

I An Baumstrünken bei Kematen (Heinricher!); Sellrain: am Holze des Straßengeländers vor Rothenbrunn 800 m (Sarnth.), ebenda und oberhalb Rothenbrunn an Fichtenstöcken (Sarnth.); Innsbruck: ebenso oberhalb Mentelberg (Sarnth.) und an der Südseite des Berg Isel, hier in einem riesenhaften 11 Zoll Höhe, 11 1/2 Zoll Breite, im Radius 8 Zoll messenden Exemplare (Eschenlohr b. Hfl. 4^s p. XXI), am Paschberg (Stolz!), an Fichtenstöcken unter Heiligwasser (Sarnth.) und im Volderwald (Sarnth.); an Lärchenstrünken bei Trins, an Fichtenstrünken bei Trins und Gschnitz, auf einem liegenden Erlenstamme vor Gschnitz (Sarnth.); an Fichtenstrünken am Brenner (H. Schenck!).

U An einem Fichtenstrunke zwischen Achenkirch und Steinberg, sowie bei Aschau in Brandenburg, an einem Erlenstamme im unteren Brandenbertale; Zillertal: an einem Fichtenstrunke unterhalb Breilahnner (Sarnth.).

K An Nadelholzstämmen (Ung. 8 p. 236); bei Westendorf (Höhnel).

E An einem Baumstamme in Innerpitsch 1430 m (Sarnth.).

D Auf *Larix* in der Galitzenklamm bei Lienz (Höhnel).

B Bozen: auf altem Bauholze am Eisakgries; Furgglau in Eppan (Hfl. 51).

[**T** Die Angabe: „in truncis Coniferarum in albis Tridentinis (Anna Rossetti)“ bei Sacc. 9 VI. p. 167 bezieht sich auf den Standort Monte Grappa bei Bassano in Italien; vergl. Sacc. 3 X. p. 539.]

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 237; 2 p. 18).

Forma *hornotina* (Swartz) Bres. in litt., *Boletus hornotinus* Swartz in *Svenska Vetensk.-Akad. Nya Handl. XXXI. (1810) p. 87*.

I Innsbruck: an einem Fichtenstocke am Fürstenwege bei Amras (Sarnth.).

Forma *annosa* (Swartz) Bres. in litt., *Boletus annosus* Swartz l. c.

I Innsbruck: an einem Fichtenstocke am Fürstenwege bei Amras (Sarnth.).

16. (815.) *P. cinnamomeus* Trog., *Fomes cinnamomeus* Sacc., *Syll. fung. VI. (1888) p. 169*, non *Boletus cinnamomeus* Jacq. (vergl. p. 191 Nr. 868). — Fr. p. 561; Rbh. I. p. 422 Nr. 980.

V An *Pirus malus* in Stein bei Feldkirch (Rick 1 p. 21).