

I Innsbruck: an der Basis eines alten Erlenstrunkes unter dem Rechenhofe (Sarnth.); bei Trius (Wettst.).
R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 237; 2 p. 18).

46. (845.) *P. lactens* Fr. — Fr. p. 546; Rbh. I. p. 434 Nr. 1022.

V Auf *Quercus* am Schellenberge (Rick 3 p. 340).

U Zillertal: an einem Erlenstrunke bei der Schwemmalpe nächst Breitlahner 1350 m (Sarnth.).

Gehört nach Hennings in Verh. bot. Ver. Brandenburg XL. (1898) p. 126 als apode Form zu *Poria vaporaria* (Pers.) Sacc., Syll. fung. VI. (1888) p. 311 (*Boletus vaporarius* Pers.). Vergl. p. 173.

47. (846.) *P. chioneus* Fr. — Fr. p. 546; Rbh. I. p. 435 Nr. 1023.

V Feldkirch: an *Pirus communis* bei Gisingen (Rick 2 p. 137).

I „An Stämmen der Laubhölzer, an alten Tannenbäumen etc.“ (Zainer!).

U Zillertal: an *Betula* oberhalb Breitlahner gegen den Pfitschergrund 1400 m (Sarnth.).

48. (847.) *P. floriformis* Quél., *P. (Merisma) floriformis* Quél. b. Bres., Fungi trid. I. p. 61 tab. 68 (1884).

V Feldkirch: an einem Tannenbrett in Reichenfeld (Rick 2 p. 137).

Italienisches Tirol: an Lärchenschindeln nahe am Erdboden (Bres. 1 I. p. 61).

49. (848.) *P. pallescens* Fr. — Fr. p. 546; Rbh. I. p. 435 Nr. 1024.

R An Laubholz. Valle Lagarina (Cob. 2 p. 18).

50. (849.) *P. epileucus* Fr. — Fr. p. 545; Rbh. I. p. 436 Nr. 1029.

V Feldkirch: an *Prunus avium* bei Tosters. Scheint sehr selten zu sein (Rick 2 p. 137).

51. (850.) *P. imberbis* (Bull.) Fr., *Boletus imberbis* Bull. — Fr. p. 543; Rbh. I. p. 437 Nr. 1031.

V Feldkirch: an *Salix* bei Reichenfeld (Rick 1 p. 20).

I Innsbruck: auf einem Strunke von *Populus nigra* an der Sill gegenüber dem Nordportal des Berg Isel-Tunnels (Sarnth.).

T Um Trient an den Stämmen von *Salix*, *Morus alba*, *Robinia*, *Fraxinus* etc. in beiden Formen, wovon die eine an *Morus alba* und *Fraxinus* vorkommt, häufig (Bres. 1 II. p. 29, jedoch mit Einschluß des *P. fumosus* als Synonym).

52. (851.) *P. fuliginosus* (Scop.) Fr., *Boletus fuliginosus* Scop. — Fr. p. 543; Rbh. I. p. 437 Nr. 1032.

V Feldkirch: an Tannen im Göffiser Walde (Rick 1 p. 21).

53. (852.) *P. imbricatus* (Bull.) Fr., *Boletus imbricatus* Bull. — Fr. p. 542; Rbh. I. p. 438 Nr. 1036.

E Brixen: an Stämmen von *Castanea sativa* bei Vahrn (Toldt b. Beck & Zahlbr. 1^a Nr. 609!, 1^b XVI. p. 65).