

**I** An einem Lärchenstrunke auf den Pflutschwiesen am Fuße des Blaser bei Steinach, 1300 m (Sarnth.).

**E** Bei Sterzing (Höhnel).

**N** Val di Sole (Bres. 2 p. 69 und in litt.).

56. (855.) **P. lobatus** (Schrad.) Fr., *Boletus lobatus* Schrad. — Fr. p. 540; Rbh. I. p. 439 Nr. 1039.

**V** Feldkirch: im Göffiser Walde am Boden (Rick 2 p. 138).

57. (856.) **P. confluens** (Alb. et Schw.) Fr., *Boletus confluens* Alb. et Schw. — Fr. p. 539; Rbh. I. p. 440 Nr. 1042; Bres., *Funghi mang.* p. 104 tab. 96.

In Nadelholzwäldern.

**O** Im Föhrenwalde bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 475).

**I** Sellrain: Fichtenwald oberhalb Tanneben (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 296), bei Innsbruck (Hb. in Hb. Mus. bot. berol.!; Höhnel), in Föhrenwäldern bei Rinn, massenhaft (Zainer!); bei Trins (Wettst.), daselbst auf einem Lärchenstrunke beim Ansitze Schneeberg (Sarnth.!).

**E** Auf einem Fichtenstumpfe bei Gossensaß (Magn.!); bei Brixen (Höhnel).

**D** Am Ederplan bei Dölsach (Höhnel).

Italienisches Tirol: rasig, in großen Gruppen in Nadelholzwäldern der mittleren Gebirgshöhe, „Fongo del pan“ (Bres. 7 1899 p. 416; 8 p. 105).

58. (857.) **P. eristatus** (Pers.) Fr., *Boletus cristatus* Pers. — Fr. p. 539; Rbh. I. p. 440 Nr. 1043.

**I** In der Umgebung von Innsbruck (Zainer!), daselbst in Nadelholzwäldern am Paschberg (Sarnth. 11 p. 475!).

59. (858.) **P. intybaceus** Fr. — Fr. p. 538; Rbh. I. p. 441 Nr. 1044.

**V** Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 1 p. 20).

60. (859.) **P. frondosus** (Fl. dan.) Fr., *Boletus frondosus* Fl. dan., *P. Barrelieri* Viv. — Fr. p. 538; Rbh. I. p. 441 Nr. 1045; Bres., *Funghi mang.* p. 105 tab. 97 und 97<sup>bis</sup>.

**K** Kitzbühel: an Ahornstrünken bei Aurach (Ung. 8 p. 237).

**E, B** Brixen: auf den Wurzeln von *Castanea* bei Vahrn; findet sich in der Gegend zwischen Franzensfeste und Klausen, wird gerne gegessen und am Markte bis zu zwei Gulden das Stück [?] feilgeboten (Toldt bezw. Beck b. Beck u. Zahlbr. 1<sup>a</sup> Nr. 307!, 1<sup>b</sup> XIII. p. 444).

Italienisches Tirol: auf den Narben lebender Stämme von *Castanea sativa*, „Ciate d'ors de castagnar“, „Spongiola de castagnar“ (Bres. 7 1899 p. 417; 8 p. 106, 105).

61. (860.) **P. umbellatus** (Pers.) Fr., *Boletus umbellatus* Pers. — Fr. p. 537; Rbh. I. p. 441 Nr. 1046.

**I** Innsbruck (Hb. Gymn. Innsbr.!).

62. (861.) **P. petaloides** Fr. — Fr. p. 536; Rbh. I. p. 443 Nr. 1050.

**I** An Laubholz. Hinterriß; am Aufstiege zum Rontale (Allescher 1/2 p. 28).