

Alpe (Stolz!); bei St. Martin im Gnadenwald an einem morschen, am Boden liegenden Laubholz-Zweige (Sarnth.); bei Trins (Wettst.).
U An *Fagus* bei Erl (Schnabl).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 237; 2 p. 17).

81. (880.) *P. fuliginus* (Pers.) Fr., *Boletus fuliginus* Pers., *B. polyporus* Bull. — Fr. p. 525; Rbh. I. p. 450 Nr. 1076.

R „In pascuis montanis Baldi, Summani et contingentium Tirolis mihi saepe occurit ad terram et ad Fagorum caudices“ (Poll. 3 III. p. 616 und Herb. nach Sacc. 2 p. 96).

82. (881.) *P. scobinaceus* (Cumino) Bres. in Almanacco agr. 1899 p. 415, *Boletus scobinaceus* Cumino in „Acta Taurin. 1805“ p. 2, *Polyporus Pes caprae* Pers., Champ. comest. (1819) p. 241. — Fr. p. 524; Rbh. I. p. 451 Nr. 1081; Bres., *Funghi mang.* p. 104 tab. 95.
T Trient: gruppenweise in Föhrenwäldern zwischen Erica bei Povo, Sant'Antonio und San Rocco (Bres. 7 1899 p. 415; 8 p. 104).

83. (882.) *P. leucomelas* (Pers.) Fr., *Boletus leucomelas* Pers. — Fr. p. 524; Rbh. I. p. 452 Nr. 1082.

In Wäldern.

V Feldkirch: im Göfiser Walde (Rick 1 p. 20).

N Val di Sole (Bres. 2 p. 69 und in litt.).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 237; 2 p. 17).

84. (883.) *P. ovinus* (Schaeff.) Fr., *Boletus ovinus* Schaeff. — Fr. p. 523; Rbh. I. p. 452 Nr. 1083; Bres., *Funghi mang.* p. 103 tab. 94.

Auf lichtem trockenem, besonders sandigem Boden in Nadelholzwäldern.

V Feldkirch: im Göfiser Walde (Rick 4 p. 325).

O Im Föhrenwalde bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 475), bei Längenfeld (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 296).

I Sellrain: im Nadelholzwalde ober Tanneben; Innsbruck: im Fichtenwalde oberhalb Amras (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 296); Gschnitztal: bei Trins (Wettst.), daselbst am Muliboden (Sarnth. 8 p. 412).

E Innerpfitsch: in einem Fichtenwalde oberhalb Stein bei 1500 m (Sarnth.).

Italienisches Tirol: truppweise in Nadelholzwäldern der Gebirge (Bres. 7 1899 p. 415; 8 p. 103).

85. (884.) *P. subsquamosus* (L.) Fr., *Boletus subsquamosus* L. — Fr. p. 523; Rbh. I. p. 452 Nr. 1084.

I In trockenen Nadelholzwäldern bei Trins (Wettst.).

B Ueberetsch: im Föhrenwalde „Holz“ zwischen Unter- und Obereget bei Eppan (Hfl. b. Rbh. 1^c Nr. 1209).

Var. *repandus* Fr., Syst. I. (1821) p. 346.

K Kitzbühel: in Nadelholzwäldern des Bichlachs, selten (Ung. 8 p. 237).

86. (885.) *P. Schulzeri* Kalchbr. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) p. 431 non Fr., Hymen. eur. (1874) p. 556, *P. tyrolensis* Sacc. et Cuboni in Sacc. Syll. fung. VI. (1888) p. 136. — Rbh. I. p. 457.