

Italienisches Tirol: einzeln in Wäldern oder Gehölzen von Laubbäumen, besonders unter Birken und Zitterpappeln, selten unter Coniferen: „Brisa“, „Brisot“, „Legorat“ (Bres. 7 p. 1899 p. 413; 8 p. 101).

Var. *fuligineo-cinereus* Fl. dan. tab. 833, siehe Sacc., Syll. fung. VI. (1888) p. 77.

M Im Martelltale hinter Gand (Höhnel).

4. (893.) *B. versipellis* Fr., *B. rufus* Schaeff. — Fr. p. 515; Rbh. I. p. 462 Nr. 1113; Bres., Funghi mang. p. 102 tab. 93.

O Im unteren Paznauntale (Höhnel); Oetzthal: auf magerem Grasboden unter Birken am Wege von Umhausen nach Niedertal, 12—1300 m (Sarnth.).

I Innsbruck: im gemischten Nadel- und Birkenwalde beim Berreiterhofe, am Paschberg (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 297) und im Fichtenwalde bei Amras (Schmidt l. c.); bei Trins (Wettst.).

M Bei Salt im Martelltale (Höhnel).

B Jenesien, Oberbozen, Sigmundskron (Pfaff als *B. rufus* Pers.).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 236; 2 p. 17).

Italienisches Tirol: gruppenweise in Laubgehölzen, besonders unter Schwarz- und Zitterpappeln: „Brisa rossa“, „Rossin“ (Bres. 7 1899 p. 414; 8 p. 102).

5. (894.) *B. porphyrosporus* Fr. — Fr. p. 514; Rbh. I. p. 462 Nr. 1116.

V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 1 p. 21).

O Bei Tumpen im Oetztales (Höhnel).

I Sellrain: am Rande des Nadelholzwaldes am Wege durch das Votschertal (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 297!); Innsbruck: am Paschberg (Höhnel).

6. (895.) *B. viscidus* L. — Fr. p. 513; Rbh. I. p. 463 Nr. 1117.

O Im Föhrenwalde bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 475).

I Bei Trins (Sarnth. Hb. F.), im Lärchengehölze beim Ansitze Schneeberg (Sarnth. 11 p. 475).

U Bei Rattenberg (Sarnth. 11 p. 475).

E Auf Alpenwiesen am Schlüsseljoch gegen Pütsch bei 1800 m (Sarnth.); bei Sterzing und Brixen (Höhnel).

B Ueberetsch: truppweise an grasigen Plätzen in Nadelholzwäldern am Fuße des Mendelschrofen (Hfl. b. Rbh. 1^o Nr. 1208!).

T Valle di Sella bei Borgo (Ambr. 12 p. 43).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 236; 2 p. 17); Serrada (Cob. 9 p. 33).

7. (896.) *B. Bresadolae* Quél. in Bres., Funghi trid. I. p. 13 tab. 14 (1881), p. 96. — Rbh. I. p. 480 Nr. 1187.

N In subalpinen Fichtenwäldern bei Ortisè im Val di Sole (Bres. 1 l. p. 14).

8. (897.) *B. floccopus* Vahl. — Fr. p. 513; Rbh. I. p. 463 Nr. 1118.

V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 1 p. 21).