

5. (942.) *P. fulvidus* Bres., Fungi trid. II. p. 56 tab. 165 (1898).

An fichtenem Zaunholz längs der Wege und an Rebpfählen in ganzen italienischen Tirol (Bres. 1 II. p. 56).

145. *Lentinus* Fr.

1. (943.) *L. flabelliformis* (Bolt.) Fr. (1838), *Agaricus flabelliformis* Bolt. (1788–1791) non Wulf. (1786), *A. (Pleurotus) flabelliformis* Fr., Syst. mycol. I. (1821) p. 185. — Fr. p. 487; Rbh. I. p. 497 Nr. 1209.

An alten Stämmen in Gebirgswäldern, in Tyrol (Rbh. 2 I. p. 514).

2. (944.) *L. ursinus* Fr. — Fr. p. 486; Rbh. I. p. 498 Nr. 1211; Bres., Fungi trid. I. p. 60 tab. 66 (1884).

N An Lindenzweigen im Val di Sole, sehr selten (Bres. 1 I. p. 60).

3. (945.) *L. bisus* Quél. b. Bres., Fungi trid. I. p. 26 tab. 12 (1882), p. 97, *L. omphalodes* Fr. (siehe Hymen. eur. p. 485) var. b. Bres. l. c. p. 12 (1881).

Italienisches Tirol: zwischen Moos oder an Holzstückchen, selten (Bres. 1 I. p. 13), stets an Stämmen oder Zweigen von Buchen oder Erlen, truppweise doch nicht rasig (Bres. 1 I. p. 26).

4. (946.) *L. badius* Bres., Fungi trid. II. p. 56 tab. 166 (1898).

F An Stämmen von *Sorbus aucuparia* bei Paneveggio (Bres. 1 II. p. 57).

5. (947.) *L. cochleatus* (Pers.) Fr., *Agaricus cochleatus* Pers. — Fr. p. 484; Rbh. I. p. 498 Nr. 1213.

V Feldkirch: an *Fagus* am Ardetzenberg (Rick 1 p. 21).

6. (948.) *L. jugis* Fr. — Fr. p. 484; Rbh. I. p. 499 Nr. 1214.

„In silvis subalpinis Tyroliae, ubi in truncis Laricis iterum lectus et mecum communicavit Heuflerus“ (E. Fries 2 p. 393 [1838], ed. 2 [1874] p. 484).

O Oetztal: auf dem Hirnschnitte von Lärchenstrünken, häufig vor und hinter Zwieselstein 1450–1500 m (Sarnth.; det. Bres. als *L. lepideus* f. *jugis* Fr.).

7. (949.) *L. adhaerens* (Alb. et Schw.) Fr., *Agaricus adhaerens* Alb. et Schw. — Fr. p. 483; Rbh. I. p. 499 Nr. 1216; Bres., Fungi trid. II. p. 25 tab. 131.

N An Nadelholz-Zweigen im Val di Sole (Bres. 1 II. p. 26).

8. (950.) *L. lepideus* Fr. — Fr. p. 481; Rbh. I. p. 501 Nr. 1222.

O An der Brücke bei Tumpen (Höhnel).

I Innsbruck: auf einem Lärchenstrunke bei den Nockhöfen (F. Saut., det. Bres.), auf abgesägten Nadelholzstrünken unter den Lanserköpfen (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 297!); bei Steinach und Trins sehr häufig auf dem Hirnschnitte von Lärchenstrünken 12–1400 m; bei Brennerpost (Sarnth!).

U Bei Kufstein (Magn.!).