

E Auf morschen Coniferenhölzern in einer Sumpfwiese am Eisakufer bei Gossensaß (Magn.!).

P An *Picea excelsa* bei Altprags (Moewes!).

D Am Fischeleinboden in Sexten (Magn.!).

N Val di Sole (Bres. 2 p. 70 und in litt.).

B Im Villnößtale (Grüb!).

T Bei Grigno in Valsugana (Höhnel).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 236; 2 p. 16).

9. (951.) *L. tigrinus* (Bull.) Fr., *Agaricus tigrinus* Bull. — Fr. p. 481; Rbh. I. p. 501 p. 1224.

An Laubholz.

P Bei Schluderbach (Bartels!).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 236; 2 p. 16).

10. (952.) *L. cyathiformis* (Schaeff.) Bres., *Fungi trid.* II. p. 93 tab. 206 (1900). *Agaricus cyathiformis* Schaeff., *Fung. Bavar. icon.* III. tab. 252 (1770). — Fr. p. 488.

An Fichtenstrünken in den Alpen des italienischen Tirol, sehr selten (Bres. 1 II. p. 94).

146. *Marasmius* Fr.

1. (953.) *M. epiphyllus* Fr. — Fr. p. 479; Rbh. I. p. 502 Nr. 1225.

An abgefallenen Blättern, Blattstielen u. dgl.

R Valle Lagarina (Cob. 3 p. 583).

2. (954.) *M. epichloë* Fr., *Hymen. eur.* (1874) p. 479.

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 16).

3. (955.) *M. perforans* (Hoffm.) Fr., *Agaricus perforans* Hoffm. — Fr. p. 478; Rbh. I. p. 503 Nr. 1230.

An abgefallenen Fichtennadeln.

In Tirol häufig (Poll. 3 III. p. 662).

I Feldkirch: im Göfiser Walde (Rick 4 p. 325).

I Im Nadelwald hinter der Kirche von Sellrain (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 297); Innsbruck: am Wiltener Berg (Stolz!; Sarnth. 11 p. 476), unter den Nockhöfen (Sarnth.!).; bei Trins (Wettst.).

K Bei Westendorf (Höhnel).

B Im Karerwalde (Magn.!).

4. (956.) *M. androsaceus* (L.) Fr., *Agaricus androsaceus* L. — Fr. p. 477; Rbh. I. p. 504 Nr. 1232.

An abgefallenen Nadeln von Nadelhölzern, besonders Fichtennadeln verbreitet.

O Im unteren Paznauntale (Höhnel), bei Mathon (Lindau); bei Tumpen im Oetztale (Höhnel).

I Innsbruck: Peterbrunnl, Iglar Wald, Sistranser Wald (Stolz!); Voldertal (Leithe 2 p. 12); Trins (Wettst.; Sarnth. Hb. F.!).

U Pertisau im Achantale (Wolf b. Sarnth. 11 p. 476!); bei Rattenberg (Sarnth. *ibid.*).