

11. (1000.) *R. veteriosa* Fr. — Fr. p. 450; Rbh. I. p. 528 Nr. 1312; Bres., *Funghi mang.* p. 69 tab. 75.

Italienisches Tirol: in Nadelholzwäldern der Gebirge (Bres. 7 1898 p. 230; 8 p. 69).

12. (1001.) *R. fragilis* (Pers.) Fr., *Agaricus fragilis* Pers. — Fr. p. 450; Rbh. I. p. 529 Nr. 1313.

In Wäldern.

**K** Bei Westendorf und Hochfilzen (Höhnel).

**P** Bei Bruneck (Höhnel).

**R** Valle Lagarina (Cob. 1 p. 235; 2 p. 16); Serrada (Cob. 9 p. 33).

Var. *violascens* Gillet, Champign. France (1878) p. 245.

**R** Valle Lagarina (Cob. 1 p. 235; 2 p. 16).

13. (1002.) *R. aeruginea* Fr. — Fr. p. 449; Rbh. I. p. 529 Nr. 1314.

**I** Trins: im Lärchengehölz beim Ansitze Schneeberg (Sarnth. 11 p. 476).

14. (1003.) *R. ochroleuca* Pers. — Fr. p. 449; Rbh. I. p. 529 Nr. 1315.

**I** Trins: auf Waldboden am Padasterbache 12—1400 m (Sarnth.).

15. (1004.) *R. citrina* Gillet in *Revue mycol.* III. (1881) p. 5, *Sacc., Syll. fung.* V. (1887) p. 471.

**K** Bei Westendorf (Höhnel).

16. (1005.) *R. pectinata* (Bull.) Fr., *Agaricus pectinatus* Bull. — Fr. p. 449; Rbh. I. p. 529 Nr. 1316.

In Wäldern.

**I** Innsbruck: am Paschberg (Höhnel).

**K** Bei Westendorf (Höhnel).

17. (1006.) *R. emetica* Fr., *Agaricus emeticus* Harzer (1842). — Fr. p. 448; Rbh. I. p. 530 Nr. 1317; Bres., *Funghi mang.* p. 67 tab. 73.

In Wäldern.

**E** Bei Sterzing und Brixen (Höhnel).

**B** Bei Bozen (Bergmeister 1 p. 17).

**T** Valle di Sella bei Borgo (Ambr. 12 p. 43).

**R** Valle Lagarina (Cob. 2 p. 16).

Italienisches Tirol: besonders in Laubgehölzen, an grasigen Waldrändern (Bres. 7 1898 p. 229; 8 p. 68).

Subspec. *Clusii* Fr. — Fr. p. 449; Rbh. I. p. 530.

**V** Feldkirch: im Göffiser Walde, häufig (Rick 1 p. 21).

18. (1007.) *R. aurora* Krombh., *Abb. Schwämme*, IX. p. 11 (ca. 1845). — Fr. p. 448 (sub *R. emetica*); Bres., *Fungi trid.* II. p. 93 tab. 105.

**T** Trient: in Laubgehölzen bei Gocciadoro, alljährlich, bisweilen zahlreich (Bres. 1 II. p. 93).