

2. (1114.) *C. obtusus* Fr. — Fr. p. 397; Rbh. I. p. 577 Nr. 1481.
K In Wäldern. Bei Hochfilzen (Höhnel).
3. (1115.) *C. decipiens* (Pers.) Fr., *Agaricus decipiens* Pers. — Fr. p. 396; Rbh. I. p. 578 Nr. 1485.
K In Wäldern. Bei Hochfilzen (Höhnel).
4. (1116.) *C. leucopus* (Pers.) Fr., *Agaricus leucopus* Pers. — Fr. p. 395; Rbh. I. p. 578 Nr. 1487.
K In Nadelholzwäldern. Bei Hochfilzen (Höhnel).
5. (1117.) *C. fulvescens* Fr. — Fr. p. 395; Rbh. I. p. 579 Nr. 1489.
O Im Föhrenwalde bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 477).
R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 234; 2 p. 14).
6. (1118.) *C. uraceus* Fr. — Fr. p. 393; Rbh. I. p. 580 Nr. 1494.
O Im Föhrenwalde bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 477).
N Val di Sole (Bres. 2 p. 69 und in litt.).
7. (1119.) *C. castaneus* (Bull.) Fr., *Agaricus castaneus* Bull. — Fr. p. 391; Rbh. I. p. 581 Nr. 1498.
 Auf feuchter Erde.
I Innsbruck: im Walde oberhalb Sistrans am Tulferer Berge bei Hall (Stolz!); Gschnitztal: bei Trins (Sarnth. Hb. F.), linke Talseite vor Gschnitz und im Martartale (Sarnth.).
R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 14).
8. (1120.) *C. saturninus* Fr. — Fr. p. 390; Rbh. I. p. 581 Nr. 1500.
 Auf grasigen Waldplätzen, Triften, in Gebüsch etc.
I Trins: in der Umgebung des Muliboden 13—1400 m (Sarnth. 8 p. 412).
 Italienisches Tirol (Bres. b. Sarnth. 8 p. 412).
9. (1121.) *C. candelaris* Fr., *Epicr.* (1838) p. 305. — Fr. p. 388.
I Innsbruck: in Nadelholzwäldern am Wiltener Berg (Sarnth. 11 p. 477).
 — *C. armeniacus* (Schaeff.) Fr., *Agaricus armeniacus* Schaeff. — Fr. p. 387; Rbh. I. p. 583 Nr. 1507.
R »In fagetis et pinetis Baldi montis et in pascuis alpinis ejusdem montis aestate mihi saepe occurrit« (Poll. 3 III. p. 690).
10. (1122.) *C. subferrugineus* (Batsch) Fr., *Agaricus subferrugineus* Batsch. — Fr. p. 387; Rbh. I. p. 583 Nr. 1508.
K In Wäldern. Bei Hochfilzen (Höhnel).
11. (1123.) *C. firmus* Fr. — Fr. p. 386; Rbh. I. p. 584 Nr. 1509; Bres., *Funghi mang.* p. 86 tab. 57.
V Feldkirch: im Göffiser Walde (Rick 4 p. 325).
U Bei Rattenberg (Sarnth. 11 p. 477).
 Italienisches Tirol: in Ringen oder Reihen sehr häufig in den Nadelwäldern der Mittelgebirge (Bres. 7 1897 p. 332; 8 p. 86).