

43. (1155.) *C. malachius* Fr. — Fr. p. 361; Rbh. I. p. 601 Nr. 1573.

I In der Hinterriß (Schnabl).

44. (1156.) *C. violaceo-cinereus* Pers., Syn. I. (1801) p. 279, Schroet. in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien III. 1 p. 596 (1889), *C. cinereo-violaceus* Fr., Epicr. (1838) p. 279. — Fr. p. 361; Rbh. I. p. 601 Nr. 1575.

In Laubholzwäldern.

K Kitzbühel: am Schattberg (Ung. 8 p. 238).

45. (1157.) *C. violaceus* (L.) Fr., Agaricus violaceus L. — Fr. p. 360; Rbh. I. p. 602 Nr. 1578.

I In Fichtenwäldern beim Volderbad (Leithe 2 p. 11) und am Trunabache bei Trins 1350 m (Sarnth. 8 p. 412).

U Rattenberg: am waldigen Abhange gegen Brixlegg zu (Sarnth. 11 p. 477).

K Kitzbühel: in Laubgehölzen am Schattberg (Ung. 8 p. 238).

P Bruneck (Wettst.).

T Valle di Sella, auf Grasboden an Waldrändern der Nordseite (Ambr. 12 p. 42).

46. (1158.) *C. argentatus* (Pers.) Fr., Agaricus argentatus Pers. — Fr. p. 360; Rbh. I. p. 602 Nr. 1579.

U In Wäldern. Bei Westendorf und Hochfilzen (Höhnels).

47. (1159.) *C. argutus* Fr., Epicr. (1838) p. 278. — Fr. p. 359.

K In Wäldern. Bei Hochfilzen (Höhnels).

48. (1160.) *C. vibratilis* Fr. — Fr. p. 358; Rbh. I. p. 603 Nr. 1582.

O Im Föhrenwalde bei der Station Oetztal (Sarnth. 11 p. 477).

49. (1161.) *C. delibutus* Fr. — Fr. p. 357; Rbh. I. p. 603 Nr. 1583.

An grasigen Stellen in Laub- und Nadelholzwäldern.

U Rattenberg, am waldigen Abhange gegen Brixlegg zu (Sarnth. 11 p. 477).

K Bei Hochfilzen (Höhnels).

50. (1162.) *C. salor* Fr. — Fr. p. 537; Rbh. I. p. 604 Nr. 1584.

Var. *naevosus* Fr., *C. naevosus* Fr., Monogr. Hymen. suec. II. (1863) p. 41, Icon. sel. II. tab. 150 fig. 2 (1880). — Fr. p. 357.

T Valle di Sella, an Waldrändern und in Fichtenwaldungen der Nordseite (Ambr. 12 p. 42).

51. (1163.) *C. collinitus* (Pers.) Fr., Agaricus collinitus Pers. — Fr. p. 354; Rbh. I. p. 605 Nr. 1591.

In Wäldern, auf Heiden u. s. w.

B Ueberetsch: häufig im Buchenwalde bei Matschatsch (Hfl. b. Rbh. 3^c Nr. 1402!).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 234; 2 p. 14).