

5. (1271.) *N. pediades* Fr. (1874), *Psilocybe pediades* Fr. (1821), *Agaricus pediades* Fr. — Fr. p. 260; Rbh. I. p. 673 Nr. 1839.

Auf Aeckern.

O Bei Tumpen im Oetztale (Höhnel).

I Innsbruck: bei Hötting (Stolz!).

P Bei Taufers (Höhnel).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 233; 2 p. 12).

6. (1272.) *N. triscopa* Fr. (1857), *Agaricus triscopus* Fr. — Fr. p. 259.

K Auf faulendem Holze an Laubholzbäumen. Bei Hochfilzen (Höhnel).

7. (1273.) *N. sideroides* (Bull.) Fr. (1838), *Agaricus sideroides* Bull. — Fr. p. 258; Rbh. I. p. 674 Nr. 1843.

An Wegen zwischen Holzsplittern, an Baumstrünken.

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 233; 2 p. 12).

8. (1274.) *N. melinoides* (Bull.) Fr. (1857), *Agaricus melinoides* Bull., *Galera melinoides* Fr. (1821). — Fr. p. 257; Rbh. I. p. 675 Nr. 1845.

K Auf Grasboden. Bei Hochfilzen (Höhnel).

R „In pratis subalpinis Baldi, ceterorumque montium Tirolis“ (Poll. 3 III. p. 668).

9. (1275.) *N. cerodes* Fr. (1838), *Agaricus cerodes* Fr. — Fr. p. 257; Rbh. I. p. 675 Nr. 1846.

I Am Boden. Bei Gschnitz (Stolz, det. Bres.).

10. (1276.) *N. horizontalis* (Bull.) Fr. (1874), *Agaricus horizontalis* Bull. — Fr. p. 256; Rbh. I. p. 676 Nr. 1852.

An Baumrinden, besonders von *Ulmus*, *Pinus* u. s. w.

K Bei Hochfilzen (Höhnel).

11. (1277.) *N. cucumis* (Pers.) Fr. (1874), *Agaricus Cucumis* Pers., *Dermocybe Cucumis* Fr. (1821), *Galera Cucumis* Fr. (1838). — Fr. p. 255; Rbh. I. p. 677 Nr. 1855.

Auf der Erde und zwischen Holzsplittern.

O Bei Tumpen im Oetztale (Höhnel).

I Innsbruck: am Paschberg (Höhnel).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 233; 2 p. 12).

12. (1278.) *N. festiva* Fr. (1838). — Fr. p. 253; Bres., *Fungi trid.* I. p. 19 tab. 22 (1882).

N Val di Sole, in sonnigen Lärchenwäldern, auf Tonschieferboden in dichten Herden (Bres. 1 I. p. 20; 2 p. 69).

13. (1279.) *N. lugubris* Fr. (1874), *Pholiota lugubris* Fr. (1821), *Agaricus lugubris* Fr. — Fr. p. 253; Rbh. I. p. 678 Nr. 1859.

N Val di Sole, in Lärchenwäldern (Bres. 2 p. 69 und in litt.).