

172. *Inocybe* Fr.

1. (1299.) *I. petiginosa* Fr. (1821), *Hebeloma petiginosum* Fr. (1874), *Agaricus petiginosus* Fr. — Fr. p. 243; Rbh. I. p. 683 Nr. 1880.

I Innsbruck: im Föhrenwalde ober Mühlau gegen die Weiherburg (Sarnth. 11 p. 478), an der Straße nach Patsch (Stolz, det. Bres.); Trins: im Lärchengehölze bei Schneeberg (Sarnth. 11 p. 478).

K Bei Westendorf (Höhnel).

2. (1300.) *I. trechispora* (Berk.) Fr., *Monogr. Hymen. Suec. II.* (1863) p. 346, *Agaricus trechisporus* Berk., *Outl. Brit. Fungol.* (1860) p. 156 tab. 8. — Fr. p. 236.

In Wäldern.

I Im Martartale bei Gschnitz (Sarnth.).

N Val di Sole (Bres. 2 p. 69 und in litt.).

3. (1301.) *I. scabella* Fr. (1821), *Agaricus scabellus* Fr. — Fr. p. 235; Rbh. I. p. 688 Nr. 1899; Bres., *Fungi trid. I.* p. 81 tab. 86.

Italienisches Tirol: truppweise in Lärchenwäldern die Form mit faserig-zerschlittem Hut und in Laubgehölzen, hier die Form mit in Schüppchen zerschlittem Hut (Bres. 1 I. p. 82).

4. (1302.) *I. calospora* Quél. in Bres., *Fungi trid. I.* p. 19 tab. 21 (1882), *Agaricus (Inocybe) calosporus* Wint. b. Rbh. — Rbh. I. p. 853 Nr. 2543.

N Val di Sole, an nassen Stellen an Bachrändern in einem Laubgehölze bei Magras, alljährlich (Bres. 1 I. p. 19).

5. (1303.) *I. fulvella* Bres., *Fungi trid. II.* p. 16 tab. 119 (1892). **T** Trient: in Laubgehölzen bei Gocciadoro (Bres. 1 II. p. 17).

6. (1304.) *I. geophila* (Bull.) Quél., *Fl. mycol. France* (1888) p. 102, *Agaricus geophilus* Bull., *A. geophyllus* Sow., *Engl. Fungi* tab. 124 (ca. 1800), *Inocybe geophylla* Fr. (1821). — Fr. p. 235; Rbh. I. p. 688 Nr. 1900.

In Wäldern.

O Oberhalb St. Anton am Arlberg (Lindau); im unteren Paznauntale (Höhnel).

I Innsbruck: Paschberg (Sarnth. 11 p. 478), Iglar Wald (Stolz!); Trins: in der Umgebung des Muliboden 13—1400 m (Sarnth. 8 p. 411).

U Bei Rattenberg (Sarnth. 11 p. 478).

K Bei Hochfilzen (Höhnel).

E Bei Brixen (Höhnel).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 11); Serrada (Cob. 9 p. 33).

Var. violacea Patouill., *Tabul. anal. 2. sér., fasc. 6* (1886) p. 21 Nr. 541 tab. 54.

O Bei Tumpen im Oetztale (Höhnel).

7. (1305.) *I. umbratica* Quél. in *Compt. rend. assoc. franç. avanc. sc. XII. sess.* (1883) p. ? tab. 6 fig. 7, Bres., *Fungi trid. I.* p. 103 (1887), *I. commixta* Bres., *l. c. I.* p. 53 tab. 58 (1884).

N Val di Sole, in Nadelholzwäldern, sehr häufig (Bres. 1 I. p. 53).