

16. (1314.) *I. eutheles* (Berk. et Br.) Fr. (1874), *Agaricus eutheles* Berk. et Br. — Fr. p. 232; Rbh. I. p. 690 Nr. 1909.

I Hinterriß: in Nadelholzwäldern beim Aufstiege zum Torwandwasserfall (Allescher $\frac{1}{2}$ p. 38).

N Val di Sole (Bres. 2 p. 69 und in litt.).

17. (1315.) *I. rimosa* (Bull.) Fr. (1821), *Agaricus rimosus* Bull. — Fr. p. 232; Rbh. I. p. 691 Nr. 1910.

In Wäldern.

O Im unteren Paznauntale (Höhnel).

I Innsbruck: bei Mühlau (Sarnth. 11 p. 478), im Iglar Wald und oberhalb Sistrans; bei Gschnitz (Stolz!).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 232; 2 p. 11).

18. (1316.) *I. asterospora* Quél. in Bull. soc. bot. France XXVI. (1879) p. 50, Sacc., Syll. fung. V. (1887) p. 780.

N Val di Sole (Bres. 2 p. 69 und in litt.).

19. (1317.) *I. hiulea* Fr. (1838), *Agaricus hiuleus* Fr. — Fr. p. 232; Rbh. I. p. 691 Nr. 1911; Bres., Fungi trid. II. p. 15 tab. 122.

Italienisches Tirol: in Fichtenwäldern (Bres. 1 II. p. 16).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 232; 2 p. 11).

20. (1318.) *I. fastigiata* (Schaeff.) Fr. (1838), *Agaricus fastigiatus* Schaeff. — Fr. p. 231; Rbh. I. p. 691 Nr. 1912; Bres., Fungi trid. I. p. 52 tab. 57, p. 103.

An grasigen Stellen, in Wäldern.

I Am rechtsseitigen Talabhänge hinter Gschnitz 13—1400 m; Griesbergtal am Brenner, in einem lichten Fichtenwalde bei 16—1700 m (Sarnth.).

U Rattenberg: am waldigen Bergabhänge gegen Brixlegg (Sarnth. 11 p. 478).

Im italienischen Tirol überall häufig, sowohl in Nadel- als in Laubholzwaldungen (Bres. 1 I. p. 52).

Var. *albida* Bres. in litt. ad Sarnth.

I Innsbruck: im Föhrenwalde oberhalb Mühlau gegen die Weiherburg (Sarnth. 11 p. 478).

21. (1319.) *I. Cookei* Bres., Fungi trid. II. p. 17 tab. 121 (1892).

Italienisches Tirol: truppweise in Fichtenwäldern (Bres. 1 II. p. 17).

22. (1320.) *I. praetervisa* Quél. b. Bres., Fungi trid. I. p. 35 tab. 38 (1883).

O Bei Tumpen im Oetztale (Höhnel).

N An grasigen Plätzen in Nadelholzwäldern der Alpen des Val di Sole und Rabbittales, häufig (Bres. 1 I. p. 35).