

B Eppan: bei Rungg in moosigen Fichtenwäldern (Hfl. 51).
R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 231; 2 p. 9).

Var. *calopus* Fr., Icon. sel. tab. 80 (1874), Hymen. eur. p. 139.
U An modernden liegenden Laubholz im Steinbergdale und Brandenbergdale unter Aschau (Sarnth.).

31. (1485.) *M. sudora* Fr. (1821?, 1838), *Agaricus sudorus* Fr. — Fr. p. 138.

U Rattenberg, am Bergabhange gegen Brixlegg (Sarnth. 11 p. 478).

32. (1486.) *M. rugosa* Fr. (1838), *Agaricus rugosus* Fr. — Fr. p. 138; Rbh. I. p. 762 Nr. 2200.

I Innsbruck: am Paschberg (Höhnel).

U Rattenberg, am Bergabhange gegen Brixlegg (Sarnth. 11 p. 478).

K Bei Hochfilzen (Höhnel).

33. (1487.) *M. excisa* (Lasch) Fr. (1874), *Agaricus excisus* Lasch. — Fr. p. 137; Rbh. I. p. 762 Nr. 2201.

K An alten Stämmen. Bei Westendorf (Höhnel).

34. (1488.) *M. cohaerens* (Pers.) Fr. (1838), *Agaricus cohaerens* Pers. — Fr. p. 137; Rbh. I. p. 763 Nr. 2203.

Zwischen abgefallenen Blättern in Laubwäldern, seltener auf Strünken.

K Bei Westendorf (Höhnel).

35. (1489.) *M. gypsea* Fr. (1838), *Agaricus gypseus* Fr. — Fr. p. 135; Rbh. I. p. 763 Nr. 2204.

An Stämmen, dicht rasig.

I Innsbruck: auf Baumstrünken bei Mentelberg (Stolz!), am Paschberg (Höhnel).

K Bei Westendorf (Höhnel).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 231; 2 p. 9).

36. (1490.) *M. lactea* (Pers.) Fr. (1821), *Agaricus lacteus* Pers. — Fr. p. 135; Rbh. I. p. 763 Nr. 2205.

Auf dem Boden in Nadelholzwäldern.

E Bei Brixen (Höhnel).

B Eppan: in Föhrenwäldern bei Rungg, häufig (Hfl. 51).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 231; 2 p. 9).

37. (1491.) *M. flavo-alba* Fr. (1838), *Agaricus flavo-albus* Fr. — Fr. p. 135; Rbh. I. p. 764 Nr. 2206.

I Innsbruck: auf Waldboden am Wiltener Berg (Sarnth. 11 p. 478); bei Trins (Sarnth. Hb. F.).

U Rattenberg, am Bergabhange gegen Brixlegg (Sarnth. 11 p. 478).

38. (1492.) *M. luteo-alba* (Bolt.) Fr. (1821), *Agaricus luteo-albus* Bolt. — Fr. p. 134; Rbh. I. p. 764 Nr. 2207.

R Zwischen Moos in Nadelholzwäldern, Valle Lagarina (Cob. 2 p. 9).