

Italienisches Tirol: in Nadel- oder Laubholzwäldern, doch vorzugsweise in Eichengehölzen, reihen- oder truppweise (Bres. 7 1897 p. 317; 8 p. 52).

8. (1509.) *C. acervata* Fr. (1821), *Agaricus acervatus* Fr. — Fr. p. 122; Rbh. I. p. 773 Nr. 2246.

Am Grunde von Baumstämmen.

B Bozen: im Haslacher- und Kühbacher Wald, häufig (Pfaff).

R Serrada (Cob. 9 p. 33).

9. (1510.) *C. tenacella* (Pers.) Fr. (1874), *Agaricus tenacellus* Pers. — Fr. p. 121; Rbh. I. p. 774 Nr. 2247; Bres., *Fungi trid.* II. p. 86 tab. 198.

Hiezu gehören nach Bresadola, *Fungi trid.* II. p. 86 (1900) *Collybia conigena* (Pers.), *A. conigenus* Pers. non Fr. und *A. stolonifer* Jungh. in *Linnaea* V. (1830) p. 396, welche von Fries als eigene, von *C. tenacella* verschiedene Art betrachtet wird. Hingegen soll nach Bresadola l. c. *B. conigena* (Pers.) Fr., *Hymen. eur.* (1874) p. 118 eine andere, von dieser verschiedene Art sein. Auch *A. plumipes* Kalchbr. soll nach Bresadola l. c. zu dieser Art gehören.

Italienisches Tirol: in Wäldern an im Boden steckenden Föhren- und Fichtenzapfen, mit *C. esculenta* (Bres. 1 II. p. 86 als *C. conigena*).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 9 als *C. tenacella*).

10. (1511.) *C. stolonifera* (Jungh.) Fr. (1874), *Agaricus stolonifer* Jungh. — Fr. p. 121; Rbh. I. p. 774 Nr. 2247 subsp.

Zwischen den abgefallenen Fichten- und Tannen-Nadeln.

(Wegen dieses von *C. tenacella* und *C. conigena* abweichenden Substrates ziehe ich vor, sie als eigene Art aufzuzählen.)

I Innsbruck: ober Hötting, am Paschberg und am Patscherkofel bei 1700 m (Stolz!).

11. (1512.) *C. esculenta* (Wulf.) Fr. (1821), *Agaricus esculentus* Wulf. — Fr. p. 121; Rbh. I. p. 774 Nr. 2248; Bres., *Fungi trid.* II. p. 85 tab. 198.

Hiezu soll nach Bresadola, *Fungi trid.* II. p. 85 (1900) *C. conigena* Fr., *Hymen. eur.* (1874) p. 118 gehören, welche nicht *Agaricus conigenus* Pers., *Syn.* (1801) p. 388 sei.

I Innsbruck: im Tale hinter dem Bauhofe bei Völs am Wegrande (Sarnth.).

Italienisches Tirol: in Wäldern an den im Boden eingesenkten Föhren- und Fichtenzapfen, selten an lose aufliegenden Zapfen, verbreitet (Bres. 1 II. p. 85).

12. (1513.) *C. nitellina* Fr. (1838), *Agaricus nitellinus* Fr. — Fr. p. 120; Rbh. I. p. 775 Nr. 2251.

I Auf Waldboden am rechtsseitigen Talabhänge hinter Gschnitz bei 13–1400 m (Sarnth.).