

Italienisches Tirol: auf Grasplätzen und Wiesen nach dem Heumahd in großen Gruppen, meist reihenweise: „Fonghi della Saetta de auton“ (Bres. 7 1896 p. 216; 8 p. 45).

**R** Valle Lagarina (Cob. 2 p. 8).

5. (1586.) **T. cnista** Fr. (1838), *Agaricus cnista* Fr., *T. cnista* subsp. *evenosum* Sacc., Syll. V. (1887) p. 132 mit der Bemerkung: „A typo Friesiano differt, lamellis non venosis, tritis non rubellis, odore alieno“. — Fr. p. 73; Bres., *Fungi trid.* I. p. 44 tab. 48, *Funghi mang.* p. 44 tab. 31.

**I** Gschnitztal: auf trockenen Alpenwiesen am Blaser 2000 m (Sarnth.).

**R** Valle Lagarina (Bres. b. Cob. 2 p. 4, 8).

Italienisches Tirol: meist truppweise auf Triften, Grasplätzen und Alpen der Voralpenregion besonders an gedüngten Stellen, im ganzen Gebiete (Bres. 1 I. p. 45; 7 1896 p. 215; 8 p. 44).

Var. **gracile** Bres., *Fungi trid.* I. p. 45 (1884).

Italienisches Tirol: meist mit der Art (Bres. 1 I. p. 45).

6. (1587.) **T. panaeolum** Fr. (1838), *Agaricus panaeolus* Fr. — Fr. p. 73; Rbh. I. p. 810 Nr. 2384.

Forma **cespitosa** Bres., *Fungi trid.* II. p. 48 tab. 153 (1898).

Italienisches Tirol: auf Grasplätzen, Bergwiesen in der Nähe von Waldbeständen, sehr häufig (Bres. 1 II. p. 48).

7. (1588.) **T. nudum** (Bull.) Fr. (1821): p. 52, *Agaricus nudus* Bull. — Fr. p. 72; Rbh. I. p. 810 Nr. 2385; Bres., *Funghi mang.* p. 43 tab. 30.

Italienisches Tirol: truppweise an Waldrändern (Bres. 7 1896 p. 214; 8 p. 43).

**R** Valle Lagarina (Cob. 1 p. 230; 2 p. 8); Serrada (Cob. 9 p. 32).

8. (1589.) **T. glaucocanum** Bres., *Fungi trid.* I. p. 7 tab. 2 (1881), p. 96, *Agaricus glaucocanus* Wint. — Rbh. I. p. 862 Nr. 2580.

Zwischen abgefallenen faulenden Nadeln.

**I** Innsbruck: am Wiltener Berg (Sarnth. 11 p. 479), im Ahrntale (K. Lantschner, det. Bres.).

**N** Val di Sole (Bres. 1 I. p. 8).

Quélet zieht in *Enchirid. fung.* (1886) *T. glaucocanum* als Varietät zur vorigen Art, worin ihm Bres. l. c. p. 96 beistimmt.

9. (1590.) **T. personatum** Fr. (1821), *Agaricus personatus* Fr. — Fr. p. 72; Rbh. I. p. 810 Nr. 2386.

**I** Innsbruck: in einem schattigen Nadelholzwald am Wiltener Berg gegen den alten Jesuitenhof (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 300!).

10. (1591.) **T. acerbum** (Bull.) Fr. (1821), p. 49, *Agaricus acerbus* Bull. — Fr. p. 71; Rbh. I. p. 811 Nr. 2389; *Funghi mang.* p. 36 tab. 21.

Italienisches Tirol: in Nadel- und auch in Laubholzwäldern, meist gruppenweise, verbreitet (Bres. 7 1896 p. 208; 8 p. 36).

**R** Valle Lagarina (Cob. 1 p. 230; 2 p. 8).