

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 229; 2 p. 7); Monte Baldo: auf Triften am Campo dell'Altissimo (Poll. 1 p. 108 als *A. bulbosa*; 3 III. p. 697).

Italienisches Tirol: in Laubgehölzen der Niederungen, verbreitet (Bres. 7 1895 p. 292; 8 p. 20).

14. (1686.) *A. verna* (Bull.) Fr. (1821). *Agaricus vernus* Bull. — Fr. p. 18; Rbh. I. p. 850; Bres., *Funghi mang.* p. 20 tab. 4.

Italienisches Tirol: in den Laubgehölzen der Niederungen, verbreitet, doch selten (Bres. 7 1895 p. 293; 8 p. 20).

15. (1687.) *A. ovoidea* (Bull.) Fr. (1821). *Agaricus ovoideus* Bull. — Fr. p. 18; Rbh. I. p. 851 Nr. 2536; Bres., *Funghi mang.* p. 18 tab. 2.

In Laubgehölzen der Niederungen unter Eichen und Kastanien (Bres. 7 1895 p. 292; 8 p. 18).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 7). Bresadola sagt l. c.: „Io non l'ho ancora trovato nel Trentino; ma mi fu detto che si trova nel tenere di Arco e di Ala, dove è conosciuto sotto il nome di „Bragaldo“, nome del resto che nel Trentino vien dato a qualunque sorta di fungo“.

16. (1688.) *A. cocolla* (Scop.) Fr. (1874). *Agaricus Cocolla**) Scop., *A. coccola* Fr. et auct. [was unrichtig ist]. — Fr. p. 18; Rbh. I. p. 851 Nr. 2537.

E In Wäldern. Bei Brixen (Höhnel).

17. (1689.) *A. caesarea* (Scop.) Fr. (1821). *Agaricus caesareus* Scop. — Fr. p. 17; Rbh. I. p. 851 Nr. 2538; Bres., *Funghi mang.* p. 17 tab. 1.

In Laubgehölzen der Weinbauregion Südtirols.

N Nonsberg (Bres. 7 1895 p. 291; 8 p. 18).

B Bozen: Oberbozen, Kampenn (Pfaff); Eppan (Hfl. b. Thümen 2 Nr. 1!).

G Judicarien (Bres. 7 1895 p. 291; 8 p. 18); bei Storo „Bragaldo rosso“ genannt (Bres. 7 1895 p. 290; 8 p. 17).

T Bei Verla oberhalb Lavis (Bres. 8 p. 18); Trient: bei Gocciadoro (Bres. 7 1895 p. 291; 8 p. 18); Valsugana: am Wege von Borgo in das Val di Sella bei San Giorgio, auf Tonboden in Kastanien- und Eichengehölzen (Ambr. 12 p. 39).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 229; 2 p. 7); bei Rovereto: „Fongo oro“ (Crist. 1 p. 348), ebenda (Bres. 7 1895 p. 291; 8 p. 18).

37. Fam. Phallaceae**),

192. *Phallus* L.

1. (1690.) *Ph. impudicus* L., — Rbh. I. p. 869 Nr. 2586.

In lichten feuchten Wäldern und Gebüschchen, in Hecken, Baumgärten u. s. w.

*) *cocolla* (ital.) die Kapuze, lat. *encolla*.

**) Vergl. zu den Familien 37—44: *Hollós* L., *Gasteromycetes Hungariae*, Magyarországi Gasteromycetái. Budapest, Franklin & Comp. 1903 imp. fol. 264 p. 31 tab.