

**U** Kufstein: am Hechtsee und zwischen Längensee und Hechtsee (Magn.!).

**M** Am Passerufer bei Meran (Magn.!).

7. (1769.) *E. epiphyllus* Sadeb. in Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. I. (1884) p. 126. — Rbh. II. (Wint.) p. 10 Nr. 2701; Sadeb. l. c. p. 56.

Auf der Unterseite der Blätter der Hexenbesen von *Alnus incana*.

**I** Innsbruck: im Höttinger Graben (Magn.!), bei der Hungerburg (Peyr. b. Magn. 12 p. 61!), oberhalb Mühlau (Peyr. l. c.!: Stolz!), am Wege zum Rechenhof, oberhalb Arzl ca. 650 m (Peyr. l. c.!: bei Trins (Magn.!).

**M** Am Trafoier Bache zwischen Prad und Gomagoi (Jaap 1 p. 76).

8. (1770.) *E. turgidus* Sadeb. in Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. I. (1884) p. 116, *Taphrina turgida* Giesenhagen in Flora LXXVIII. (1895) Erg.-Bd. p. 340. — Rbh. II. (Wint.) p. 8 Nr. 2695; Sadeb. l. c. p. 59.

Auf der Unterseite der Blätter großer Hexenbesen von *Betula „alba“*.

**O** Oetztal: noch zwischen Heiligkreuz und Vent bei ca. 1700 m (Sadeb. 3 p. 59, 60).

**I** Innsbruck: am Spitzbühel (Zarli b. Magn. 12 p. 62!), bei Völs (Stolz!).

9. (1771.) *E. betulinus* (Rostr.) Sadeb. in Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. X. 2 (1893) p. 60, *Taphrina betulina* Rostr. in Tidsskr. f. Skoobr. VI. (1883) p. 246.

**I** Auf der Unterseite der Blätter der Hexenbesen an *Betula „carpatica“* im Torfmoore bei Seefeld (Jaap 1 p. 76!).

10. (1772.) *E. Alni incanae* (Kühn) Sadeb. in Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. X. 2 (1893) p. 68, *E. alnitroquus* forma *Alni incanae* Kühn in Rbh., Fungi eur. exs. Nr. 1616 (1873), *Taphrina Alni incanae* Magn. in Hedwigia XXIX. (1890) p. 25, *E. amentorum* Sadeb. in Sitzungsber. Ges. f. Bot. Hamburg IV. (1888) p. 90. — Sadeb. l. c. p. 67.

In den Zapfenschuppen von *Alnus incana*; in den Alpen sehr verbreitet (Sadeb. 2 p. 77, 79; 3 p. 67).

**I** Innsbruck: ober dem Höttinger Bild (Heinricher!), am Mühlauer Berge (Zimmerer), oberhalb Sistrans (Stolz); am Gschnitzer Bach bei Steinach 1070 m, bei Trins 1220 m (Sarnth.!), Sondestal bei Gschnitz (Magn.!), bei Gschnitz am Fuße des Habicht 1400 m auf einer *Alnus*, welche Murr und Callier als *A. incana* × *viridis* bestimmten (Sarnth.!).

**U** Achenal: Pertisau (Magn.!: Thomas), am Wege von Jenbach nach Maurach (Magn.!).

**K** Am Wege von Paß Thurn nach Kitzbühel (Zettnow!).

**B** Am Fretschbache (Jaap 1 p. 76) und am Frommbache bei Ratzes ca. 1260 m (Thomas); zwischen Birchabruck und Eggen (Kabát).

11. (1773.) *E. viridis* Sadeb. in litt. ad Magnus bei Jaap in Deutsch. bot. Monatsschr. XIX. (1901) p. 76, *Taphrina Alnastri* Lagerh. in Vestergr., Micromyc. sel. exs. Nr. 720 (1903).

Fleckenweise auf Blättern von *Alnus viridis*.