10. (1954.) **L. muscigenae** (Anzi) Rehm (1890), Celidium muscigenae Anzi, Celidiopsis muscigenae Arn. — Arn. Nr. 836; Rbh. III. (Rehm) p. 379 Nr. 4869.

I Waldrast: selten auf *Physcia muscigena* am Kalbjoch (Arn. 1 XI. p. 521).

11. (1955.) **L. dubia** Rehm (1890), Dactylospora dubia Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 393. — Arn. Nr. 1046; Rbh. III. (Rehm) p. 379 Nr. 4870.

I Parasitisch auf *Lecanora cenisia* am Wege von der Waldrast nach Matrei, selten (Arn. 4 XIV. p. 484 Nr. 2: XXX. p. 393; 3 Nr. XXXIV. p. 7; b. Rehm 8 p. 380).

12. (1956.) **Leciographa** .... „Dactylospora planta rhododendrina" Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 393. — Arn. Nr. 843.

O Mittelberg: selten auf der Rinde eines *Rhododendron*-Stämmchens (Arn. 4 XVII. p. 544 Nr. 46); Gurgl: nur in einigen Apothecien am entblößten Holze eines abgedorrten *Rhododendron*-Stämmchens beim Langthaler Eck (Arn. 4 XV. p. 380 Nr. 55).

Rehm in Rbh., Krypt.-Fl. III. p. 380 (1890) erwähnt diese Vorkommnisse anmerkungsweise bei L. dubia. Da jedoch Arnold später in seinem zweiten „Verzeichniss der Lichenen von Tirol" (1897, siehe oben) D. dubia unter einer eigenen Nummer von der Pflanze auf Rhododendron unterscheidet, so möge sie hier einstweilen als eigene Art aufgeführt sein.

13. (1957.) **L. parasitica** A. Mass., Symb. lich. (1854) p. 66, Kbr., Par. p. 463 (1865), Opegrapha monspeliensis Nyl. in Mém. soc. Cherbourg III. (1855) p. 201, Leciographa monspeliensis Müll.-Arg. — Arn. Nr. 837; Rbh. III. (Rehm) p. 380 Nr. 4872.

R In Gruppen am Rande des Thallus von *Verrucaria calciseda* bei Castell Penede bei Nago und auf dem Thallus von *Aspicilia calcarea* f. *farinosa* am alten Wege von Arco nach Nago und am Castell Penede (Kst. 4 VII. p. 304, 308), auf letzterer Wirtspflanze an der Ponalestraße, nicht selten (Arn. 4 IX. p. 311).

Forma **mutilata** Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. (1872) p. 306, XXX. (1880) p. 152, L. monspeliensis var. mutilata Rehm. — Rbh. III. (Rehm) p. 381.

G Stenico: Kalk, auf einem grauen, sehr zarten *Amphoridium*-Thallus (Kst. 4 V. p. 327).

T Monte Gazza, Kalk (Kst. 4 IV. p. 321); Lavini di San Marco bei Mori, auf Kalkfelsen, scheint nicht selten zu sein (Arn. 4 IX. p. 306).

Forma **conglobata** Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVI. (1896) p. 308.

R Auf Mauern bei Torbole über dem Thallus von *Endocarpon pallidum* (Kst. 4 VII. p. 308).

14. (1958.) **L. Arnoldii** Rehm in Rbh., Krypt.-Fl. III. (1891) p. 382, Dactylospora — Arn. in Flora LXVIII. (1885) p. 222, D. Arnoldi Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVI. (1896) p. 114. — Arn. Nr. 1048; Rbh. III. (Rehm) p. 382 Nr. 4874.