

Var. *intextum* Almq., *Bilimbia lecideoides* Anzi, *Lecidea trigemmis* Stizenb., *Bilimbia trigemmis* Arn. in Flora LII. (1869) p. 258, *Cercidospora trigemmis* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 136. — Arn. Nr. 877; Rbh. III. (Rehm) p. 429, 1261.

I Waldrast: selten an Kalkfelsen der Matreier Grube (Arn. 4 VI. p. 1128).

K Großer Rettenstein: nicht häufig am Abhänge, auf Dolomit (Arn. 4 V. p. 538).

B Seiseralpe: nicht häufig an Augitporphyrfelsen längs des Heuweges, an Dolomifelsen unweit der Zallinger Schwaig (Arn. 4 IV. p. 613, 643).

F Paneveggio: parasitisch im Hymenium der *Lecidea enteroleuca atrosanguinea* hie und da auf Kalkfelsen und -Steinen des Monte Castellazzo (Arn. 4 XXIII. p. 136).

285. *Lecideopsis* Almq.

1. (1989.) **L. galactites** (DC.) Almq., *Verrucaria galactites* DC., *Arthonia galactites* Duf. — Rbh. III. (Rehm) p. 433 Nr. 4924.

?**M** Auf *Fraginus ornus* um Gratsch bei Meran, nicht selten (Milde 30 p. 5, 10, det. Hepp).

2. (1990.) **L. excipienda** (Nyl.) Rehm, *Arthonia astroidea* var. *excipienda* Nyl., *A. excipienda* Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLIV. (1894) p. 210. — Rbh. III. (Rehm) p. 434 Nr. 4925.

B Auf *Berberis* unweit des Remphofes in Jenesien; auf *Fraginus ornus* bei Moritzing (Kst. 4 VI. p. 223, 210).

3. (1991.) **L. cembrina** (Anzi) Rehm (1891), *Arthonia cembrina* Anzi. — Rbh. III. (Rehm) p. 434 Nr. 4926.

M An glatter Rinde junger Stämmchen von *Pinus cembra* in den Hochalpen um den Ortler (Rehm 8 p. 434).

4. (1992.) **L. Cytisi** (A. Mass.) Rehm, *Arthonia Cytisi* A. Mass., Kbr., Par. p. 267 (1862), Willey, Synops. *Arthonia* p. 29 Nr. 181. — Rbh. III. (Rehm) p. 435 (nach Nr. 4926).

R Auf einem *Cytisus*-Stamme al Campione am Monte Baldo (A. Mass. b, Anzi 1 Nr. 92).

286. *Arthonia* Ach.

1. (1993.) **A. punctiformis** Ach., *Arthonia atomaria* A. Mass., non *Arthopyrenia punctiformis* (Pers.) Arn. — Arn. Nr. 985; Rbh. III. (Rehm) p. 435 Nr. 4927 p. p.; Willey l. c. p. 41 Nr. 261 p. p.

P Ehrenburg, auf Pappelrinde (Kst. 4 VII. p. 297).

B Jenesien: auf *Fagus*, *Betula*, *Ulmus*, *Alnus viridis*, *Fraginus excelsior*, *Corylus avellana* (Kst. 4 V. p. 342 Nr. 17 u. 21, p. 343, p. 346 Nr. 28, p. 348), auf *Prunus cerasus*, eine fragliche Form auf *Rhamnus frangula* (Kst. 4 VI. p. 222, 224; b. Arn. 4 XXX. p. 215); Bozen: an *Celtis australis* ober Gries (Kst. 4 VI. p. 209).

Forma *quadriseptata* (Ohlert) Arn. in Flora LV. (1892) p. 572, Beck et Zahlbr. in Ann. naturhist. Hofmus. Wien XV. (1900) p. 206, *A. quadriseptata* Ohlert in Schrift. physik.-ökon. Ges. Königsberg XI. (1870) p. 41, *A. quinqueseptata* Ohlert l. c., *A. punctiformis* f. *quinqueseptata* Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 649. — Rbh. III. (Rehm) p. 435 Nr. 4927 als Synonym von *A. punctiformis*; Willey l. c. p. 42.