

287. *Arthothelium* A. Mass.

1. (1997.) *A. anastomosans* (Ach.) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. (1872) p. 304, *Arthonia radiata* var. *anastomosans* Ach., Kbr., Par. p. 265 (1862), *A. astroidea* var. *anastomosans* Nyl., Lich. scand. (1861) p. 259 (nach Willey). — Arn. Nr. 619; Rbh. III. (Rehm) p. 442 Nr. 4936; Willey l. c. p. 53 Nr. 319.

? **M** An *Fraxinus ornus* um Meran nicht häufig (Milde 21 p. 24; 30 p. 5 als *Arthonia astroidea*; 30 p. 10 als *A. astroidea* γ *anastomosans* (Ach.) Hepp, Flecht. Eur. Nr. 353, fide Hepp).

B ? Auf der Rinde von *Fraxinus excelsior* und *Alnus incana* in Ratzes (Milde 21 p. 23 als *Arthonia astroidea*; 29 p. 19 als *A. astroidea* γ *anastomosans* wie oben*); Jenesien: auf *Picea excelsa* am Remp, an Lärchenästen und -zweigen (Kst. 4 III. p. 722, 725); Ueberetsch: selten an den oberen Zweigen von *Rhododendron ferrugineum* bei den Eislöchern (Arn. 4 VIII. p. 304, X. p. 116; 1 Nr. 514).

2. (1998.) *A. Flotowianum* Kbr. — Arn. Nr. 986; Rbh. III. (Rehm) p. 42, 1261 Nr. 4937.

L An älteren Föhren ober dem Stuibenfall bei Reutte (Arn. 4 XXIX. p. 126).

288. *Rhymbocarpus* Zopf.

1. (1999.) *Rh. punctiformis* Zopf in Hedwigia XXXV. (1896) p. 357.

B Gröden: auf dem Thallus von *Rhizocarpon geographicum* zwischen Unterkofel und dem Bräuhaus gegen St. Ulrich (Arn. 1 Nr. 1772), an einem Porphyrblocke an der Straße bei Wolkenstein gegen St. Ulrich (Arn. 4 XXX. p. 218; b. Zopf 1 p. 122).

62. Fam. *Bulgariaceae*.289. *Agyrium* Fr.

1. (2000.) *A. rufum* (Pers.) Fr., *Stictis rufa* Pers. — Arn. Nr. 633; Rbh. III. (Rehm) p. 450 Nr. 4940.

O Vereinzelt an Fichten in der Rosannaschlucht bei St. Anton am Arlberg (Arn. 4 XXIX. p. 141).

I Selten auf dem Holze der entrindeten Krummholzzweige am Blaser (Arn. 4 XI. p. 510).

F Selten auf dem Holze abgedorrter Fichtenzweige bei Paneveggio (Arn. 4 XXIII. p. 140).

2. (2001.) *A. caesium* Fr., *Lecidea symmictella* Nyl., *Biatora symmictella* Th. Fr. — Arn. Nr. 952; Rbh. III. (Rehm) p. 451 Nr. 4942.

B Jenesien: an Lärchenpfosten einer Hütte auf dem Salten (Kst. 4 III. p. 720).

*) Arnold verzeichnet diese Angabe in 4 IV. p. 626 (1869) als „*Arthonia astroidea* var. *anastomosans* Hepp an Erien. (Milde)“; im 1. Verzeichniß der Tiroler Lichenen (1880) p. 143 erscheint derselbe Name sub Nr. 607 mit dem Zusatze: „(stellulata et tymnocarpa Ach. vix diversae)“, im 2. Verzeichniß (1897) wird ganz darüber hinweggegangen. *A. astroidea* siehe im IV. Bd. dieses Werkes p. 489.