

F Auf dem Hirnschnitte alter Fichtenstrünke im Walde unterhalb Paneveggio (Arn. 4 XXIII. p. 142; 1 Nr. 1001).

290. Orbilia Fr.

1. (2002.) **O. coccinella** (Smft.) Karst., Peziza coccinella Smft. — Rbh. III. (Rehm) p. 453, 1261 Nr. 4945.

O Auf *Alnus viridis* im Pitztale (Rehm !).

B Bei St. Ulrich in Gröden (Lütken, det. Rehm).

2. (2003.) **O. vinosa** (Alb. et Schw.) Karst., Peziza vinosa Alb. et Schw. — Rbh. III. (Rehm) p. 457 Nr. 4949.

O An trockenfauligen meist entrindeten Aestchen von *Rhododendron ferrugineum* im Oetztal (Rehm 8 p. 457), auf Zweigholz von *Rhamnus sp.* bei Tumpen (Höhnel).

K Kitzbühel: an morschem Holze im Zettelwalde (Ung. 8 p. 234).

M An Aestchen von *Pinus cembra* wie oben im Ortlergebiet (Rehm 8 p. 457).

3. (2004.) **O. glacialis** Rehm (1891). — Rbh. III. (Rehm) p. 461 Nr. 4956.

O An dünnen Blütenstengeln von „*Petrocallis pyrenaica*“ beim Taschachgletscher im Pitztale (Rehm 8 p. 461). — Die genannte Nährpflanze fehlt jedoch sicher an jenem Standorte!

4. (2005.) **O. Primulae** (Rehm) Sacc., Calloria Primulae Rehm (1875). — Rehm III. (Rehm) p. 461 Nr. 4957.

O An dünnen grundständigen Blättern von *Primula glutinosa* in Ritzen der Gneißfelsen bei den Finstertaler Seen in Kühetai (Rehm 5 Nr. 264; 7 p. 47).

291. Calloria Fr.

1. (2006.) **C. Urticæ** (Pers.) Schroet. in Cohn, Krypt.-Fl. Schles. III. 2 p. 121 (1893), Tremella Urticæ Pers. (1801), Dacrymyces Urticæ Fr. (1823), Peziza fusarioides Berk. et Br. (1837), Calloria fusarioides Fr. (1849). — Rbh. III. (Rehm) p. 463, 1261 Nr. 4960.

Auf dünnen Stengeln von *Urtica dioica*.

I Innsbruck: am Sillkanal (Giovanello Hb. F.!) und im Garten des Stiftes Wilten (Prantner Hb. F.!).

U Bei Hinterbärenbad (Rehm 11 p. 13).

M „Ad campos glacie perenni rigentes montis Ortleri“ (Bail 2 Nr. 176, p. 112).

292. Ombrophila Fr.

1. (2007.) **O. violacea** (Hedw.) Fr., Octospora violacea Hedw., Musc. frond. II. (1789) p. 27 tab. 8. — Rbh. III. p. 477 Nr. 4969; Bres., Fungi trid. II. p. 81 tab. 195.

V Auf feuchtem, hartem Holz in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 4 p. 349).

K Bei Hochfilzen (Höhnel).

N Auf dem Holze und entrindeten Zweigen von *Alnus incana* im Val di Sole, selten (Bres. 1 II. p. 81).