

8. (2081.) **P. cespitosula** (Bres.) Rehm (1892), Helotium caespitosulum Bres., Pseudohelotium caespitosulum Sacc., Syll. fung. VIII. (1889) p. 293. — Rbh. III. (Rehm) p. 674 Nr. 5226; Bres., Fungi trid. I. p. 70 tab. 75, p. 105.

N An dünnen Stengeln von *Aconitum napellus* am Monte Peller bei Cles (Bres. 1 I. p. 70; b. Rehm 8 p. 674).

9. (2082.) **P. fuscosanguinea** Rehm (1892). — Rbh. III. (Rehm) p. 675 Nr. 5228.

F An dünnen Stengeln von *Cirsium spinosissimum* auf den Alpen bei Predazzo (Arn. b. Rehm 8 p. 675).

10. (2083.) **P. calloriooides** Rehm (1892), Helotium calloriooides Rehm (1882). — Rbh. III. (Rehm) p. 676 Nr. 5230.

O Auf faulenden Stengeln von *Aconitum rostratum* (*A. variegatum*) beim Kartelgletscher im Moostale am Arlberg 2000 m (Britzelm. b. Rehm 7 p. 98; 8 p. 676).

11. (2084.) **P. plicatula** Rehm (1892). — Rbh. III. (Rehm) p. 676, 1266 Nr. 5231.

O Auf faulenden Stengeln von *Aconitum napellus* am Taschachgletscher im Pitztale (Rbh. 8 p. 677).

12. (2085.) **P. aspidiicola** (Berk. et Br.) Rehm (1892), Peziza aspidiicola Berk. et Br. — Rbh. III. (Rehm) p. 684, 1266 Nr. 4246.

V Auf faulenden Wedeln von *Aspidium filix mas* in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 4 p. 349).

309. Belonium Sacc.

1. (2086.) **B. carnosulum** Rehm (1892), Helotium carnosulum Rehm (1882), Helotiella carnosula Sacc. — Rbh. III. (Rehm) p. 686 Nr. 5249.

[**O** Am Taschachgletscher im Pitztale 2000 m (Rehm 7 p. 98), was nicht richtig ist: Rehm in litt. ad Sarnth.]

I Am Grunde faulender Stengel von *Cirsium spinosissimum* am Alpeiner-gletscher im Stubaitale 2270 m (Rehm 7 p. 98; 8 p. 686 und in litt.).

2. (2087.) **B. pruiniferum** Rehm (1892), Peziza pruinifera Rehm, Ascom. exs. Nr. 304 (1876), Beloniidium pruiniferum Rehm (1882). — Rbh. III. (Rehm) p. 687 Nr. 5250.

O An faulenden Stengeln von *Cirsium spinosissimum* und *Aconitum napellus* beim Taschachgletscher im Pitztale (Rehm 5 Nr. 304; 8 p. 687).

3. (2088.) **B. nardincolum** Rehm (1893), Heterosphaeria nardincola Rehm (1875), Crumenula nardincola Rehm (1881). — Rbh. III. (Rehm) p. 690 Nr. 5254.

O An der Spitze durrer Blätter von *Nardus stricta* bei Kühetai (Rehm 5 Nr. 268!; b. Minks 2 I. p. 97); hieher gehört nach brieflicher Mitteilung Rehm's auch die Angabe: „zunächst den Gletschern im Stubaital“ (Rehm 8 p. 690).