

6. (2256.) *P. chrysopela* (Cooke) Rehm (1894), *Peziza chrysopela* Cooke, *P. ollaris* Pers. non Fr. nach Bres., *Fungi trid.* II. p. 77 (1898). — *Rbh.* III. p. 1005 Nr. 5684.

V Auf Blumentöpfen des Warmhauses in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 1 p. 61).

In Gärten und auf Blumentöpfen namentlich in Gewächshäusern spärlich, doch jedes Jahr im italienischen Tirol (Bres. 1 II. p. 78).

7. (2257.) *P. violaceonigra* Rehm (1894), *Postularia violaceonigra* Rehm (1882). — *Rbh.* III. (Rehm) p. 1007 Nr. 5688.

V An Holz und angrenzender Erde in der Gamp bei Feldkirch (Rick 1 p. 61).

8. (2258.) *P. repanda* (Wahlenb.) Rehm (1894), *Peziza repanda* Wahlenb. — *Rbh.* III. (Rehm) p. 1007 Nr. 5689.

V An einem alten Tannenstrunke in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 4 p. 350).

9. (2259.) *P. granulosa* (Schum.) Magn., *Peziza granulosa* Schum., *Enum. pl. Saelland.* II. (1803) p. 415; Bres., *Fungi trid.* II. p. 77 tab. 191 (1898).

N In Nadelholzwäldern im Val di Sole und bei T Sopramonte (Bres. 1 II. p. 77).

Während Fries in *Syst. mycol.* II. (1823) p. 51 *Peziza granulosa* Schum. als volles Synonym zu seiner *P. (Aleuria) repanda* Wahlenb. zieht, läßt Bresadola l. c. *P. granulosa* Schum. nur für einen Teil der von Fries unter *P. repanda* Wahlenb. verstandenen Art gelten, während er (p. 75) *P. repanda* Wahlenb. zu *P. varia* (Hedw.) Fr. zieht. Ich kann sie daher nur mit Bresadola's begrenzter Bestimmung unter *Plicaria* aufführen. Hingegen stellt Rehm l. c. p. 975 *Octospora verna* Hedw. gleich *Peziza (Aleuria) varia* Fr., *Syst. mycol.* II. p. 61 wenn auch mit Zweifel zu *Geopyxis*, woselbst sie von mir aus Bres., *Fungi trid.* II. p. 75 aufgeführt ist. Und Rehm unterscheidet sie mit Fries von *Plicaria repanda* (Wahlenb.) Rehm, welche wieder Bresadola mit *Peziza varia* (Hedw.) Fr. vereint. Ich wage daher nicht, Ricks Angabe von *Plicaria repanda* mit *Geopyxis varia* oder *Plicaria granulosa* zu vereinigen.

10. (2260.) *P. fimeti* (Fuckel) Rehm (1894), *Humaria fimeti* Fuckel, *Peziza fimetaria* Schum., *Enum. pl. Saelland.* II. (1803) p. 426 nach Bres., *Fungi trid.* II. p. 78 tab. 192 (1898). — *Rbh.* III. (Rehm) p. 1009 Nr. 5692.

V Auf Pferdemit in Reichenfeld und im Göliser Walde bei Feldkirch (Rick 3 p. 395).

Auf Kuh-, Pferde- und Schweinemit im italienischen Tirol, ziemlich häufig (Bres. 1 II. p. 78).

11. (2261.) *P. brunneoatra* (Desm.) Rehm (1894), *Peziza brunneoatra* Desm., *Aleuria brunneoatra* Gillet. — *Rbh.* III. (Rehm) p. 1010 Nr. 5693.

Auf Erdboden.

V In Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 4 p. 350).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 21).